

D. O. M. A.
DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS
De
EPILEPSIA,

QUAM
DECRETO ET AUTORITATE
NOBILISSIMI ET GRATIOSISSIMI COLLEGI MEDICI
in Academia Salana

PRÆSIDE
MAGNIFICO RECTORE
VIRO

Nobilissimo, Excellentissimo atque Experientissimo
Dn. CHRISTOPHOROSCHEL-
HAMMERO, Hamburgensi, Medicinæ Do-
ctore, Anatomix, Chirurgix atq; Botanices Professo-
re Publ. Horti Medici Præfecto, Facultatis Decano Spectatissimo,

Dn. Promotore ac Patrono suo colendo,

*Pro consequendis summis in ARTE MEDICA HONORI-
BUS & PRIVILEGIIS DOCTORALIBUS*

Publicæ disquisitioni subicitur

JOHAN GEORG MACASIUS,
Egranus.

ad diem 9. Octobr.

Horis locoque solitis.

JENÆ,
E Chalcographéo LOBENSTEINIANO.
ANNO cl3 l3c XLIV.



VIRIS

*Nobilissimis, Amplissimis, Excellentissimis,
Experientissimis*

DN. JOHANNI MICHAELIS, Phil. & Med. Do-
ctori, & in Academia Lipsiensi Professori Publ. cele-
berrimo, Facultatis Seniori, minoris Principum Colle-
gii Collegiato, & Illustrissimi Principis Dn. Dn. Fri-
derici Wilhelmi, Ducis Saxoniae Consi-
liario Medico &c.

DN. WERNERO ROLFINCKIO, Phil. & Med.
Doctore, per Europam famigeratissimo, Practicae &
Chim. in Academia Jenensi Professori Publ. Celeber-
rimo, Facultatis Seniori venerando, &c.

DN. JOHANNI REHFELDIO, Med. Doctore Emi-
nentissimo, in perantiqua Erphordana Professori Publ.
Celeberrimo, ejusdem Reipubl. Consuli
spectatissimo:

*Dominis Praeceptoribus, Patronis ac Promotoribus
suis filiali observantia & honore colendis,*

Hoc exercitium inaugurale in grati animi τεκμή-
ριον & ulterioris favoris incitamentum

submisit offert

Johan Georg Macasius,
Autor & Respondens.



I. N. J.



Varium & portentosum morbi genus Epilepsia! ad cuius nomen *Plinius* despui sverum scripsit, terribile siquidem in accessione, horrendum in vigore, turpe in desinentia; adeò, ut si se mutuò in accessionibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent, non ultra vitam ducere vellent. Ab ea homo, omnium animalium potentissimus rex, à quo omnia debellari debuerant, tam subito prosternitur, tamque horrenda distensione còussione atq; tortura, atrocissimè dilaniatur ac disperditur cum magno astantiù pavore & timore. Præcipuū enim ejus propugnaculum, ac fortissimam arcem, cerebrum nempe, rationis & animæ summam sedem, invadere audet, hacque obfidione & incautis insultibus prorsus æquat ea solo, ac extremam ruinam sensibus nostris tum internis, tum externis, nec non ipsis spiritibus, vitæ nostræ assertoribus, intentat & minatur. Abstrusa autem est ejus natura, ægreque se cognoscendam præbet; lis quidem est perpetua, æquus autem judex inventus adhinc nullus; unde *Averrhoës* omnes de hoc morbo disceptationes fabulis cantantium aut musicorum dixit esse proximas. *Crato* etiam celeberrimus medicus veram mali epileptici ante vitæ exitum dignotionem exoptat *epist. 137. Scholtzj.*

Sed cum hostis ingenio ipsius incognito & spreto potissimas exerat vires, ideò, ut insultus ejus manifestos & machinationes clandestinas devitemus, naturam ejus quantum ex arte licet, ex fontibus Dogmaticis & Hermeticis expiscari, quaque ratione aggressiones ejus præsentis elidi, futuræ verò devitari queant, thesibus hisce inauguralibus tradere conabimur. Tu verò

O nostris quæso Deus annue cœptis.

Ut autem πολυμορφόν τι est epilepsia, quam alii ab Ὀπ-
 λαυξάνειν, quod cerebrum & partes subjectas ita apprehen-
 dat, ut functiones illarum intercipiat *Cælius Aurelianus* l. 2. ac. c.
 4. alii ab Ὀπλείπειν derivant, ita etiam varia tum apud Do-
 gmaticos, tum apud Hermeticos sibi acquisivit nomina, par-
 tim à symptomatibus, partim à loco, causis, subjecto de-
 prompta.

Hipp. dicitur morbus sacer communiter lo-
 quendo l. de morb. sacr. (quan-
 quam hanc nominis notatio-
 nem l. d. refutet) vel ob ma-
 gnitudinem, vel ob curæ diffi-
 cultatem, vel ob causæ subli-

Paracelsus, qui morbis reme-
 diorum nomina plerunque
 accommodavit, vocat mor-
 bum Olatum, viridellum t. 1.
 p. 72. caducum l. de cad. mor-
 bum sideratum *Quercet. in*
tetrad. p. 158.

mitatem, vel ob partem obsessam *Aretæus de caus. & sig. diut.*
morb. l. 1. c. 4. pulchrè de hac nominis notatione differit *Lang-*
gius l. 1. epist. 25. Morbus item puerilis l. de aër. loc. & aq. ful-
 gor puerilis 6. *Epid. f. 1. t. 5.* ὄσος etiam μεγάλη. *Aristoteli*
probl. 1. f. 30. vocatur morbus Herculeus, sive, ut ipse vulg.,
 quod Hercules tanquam melancholicus ea laboraverit, sive
 secundum *Gal. 6. Epid. com. 6. t. 7.* quod sit δυσκαταμάχητόν ἢ.
Cælio dicitur lunaticus. A Latinis sc. *Celso* l. 3. c. 23. vocatur
 major morbus, Comitialis, quod in Comitibus frequentissimè
 manifestetur, & quod hujus causa antiquitus differebantur.
Q. Serenus; undè etiam *Plinio, Cassio, Gellio* l. 1. c. 20. Sonticus
 dicitur, *Apulejo* divinus, aliis caducus. *Avicenna* puerorum
 matrem appellari placuit. Germanico idiomate venit
 das Fiesel/schwere Noht/Gebrechen/fallende Sucht.

Sumitur vox caduci vel generaliter l. 3. *panogr. c. 1. §. 2.*
 & 3. t. 4. l. de cad. t. 5. p. 239. pro vertigine, tremore,
 ecstasi, syncope, matricis suffocatione, tetano, oris tortura,
 incurvatione spinæ dorsi, jectigatione &c. vel specialiter
 pro epilepsia propriè dicta à *Paracels. d. l. Severin. id. med. c. 14.*
Scheuneman. med. ref. c. 3. Quercet. in tetrad.

Est autem Epilepsia (*secundum Dogmaticos*) motus convulsivus interpolatus totius corporis, cum sensuum principumque facultatum detentione, dependens ab insigni irritatione principii nervorum & membranarum cerebri.

GENUS est motus convulsivus, symptoma in motu depravato *Gal. 3. loc. aff. 7.* hunc præ detentione facultatum principium elegimus. Quæcunque enim facultatum animalium primò afficitur, ejus etiam symptoma generis loco ponendum; jam verò fa-

cultati motrici hoc accidit. Nam quando causa epileptica cerebro communicatur, membranas & nervorum principium vellicat & molestat. Hinc facultas expultrix insurgit ad expulsionem molesti, undè dilatat se cerebrum & magna deinde vi constringit. Quia autem ex se sufficiens non est ad noxii depulsionem, facultatem motricem in consensum trahit, quæ lacessita totum genus nervosum in expulsionem movet. Interim dum ita constringitur cerebrum, spiritus variis modis turbantur. Cum autem ad functiones principes non solum spirituum præsentia, sed & in motu legitima dispositio requiratur, cum sola quies secundum *Hipp. l. de morb. sacr.* cerebrum sapere faciat, prudentiam subministret & intelligentiam causet, illo læso, has etiam lædi necesse est; hæc tamen læsio saltem secundariò & ob spirituum vehementem *irregularem* accidit. Imò dantur etiam epilepsiæ spuria, in quibus tamen nec interiorum nec exteriorum sensuum manifestæ læsiones apparent, motus verò convulsivi utpl. adsunt *Valles. l. 5. contr. 16.* id quod nuperrimè in fœmina quadam Cygnea ob-

Epilepsia (*secundum Hermeticos*) est morbus spiritualis, ortus à vapore & ali, maligno, mordicante, pungente, acido, membranas cerebri & nervosum genus constringente, vellicante, spiritusque turbante, cum sensuum & rationis interceptione.

GENUS est morbus spiritualis, quod docent causa ejus subtilissima, generationis modus spiritualis, penetratio validissima, qua sæpe ex improvviso, momento qd. adoritur, nec non curationis ipsius momento *Petr. diff. harmon. l. 1. diff. 6*

servavi, quæ illas convulsiones etiam aliquo modo sensit. Ex eadem causa sensuum etiam abolitio deduci potest; nam, ut sensio fiat, duobus opus est, alteratione scil. instrumenti & alterationis perceptione & dijudicatione; at hic sensus communis præpeditus est, & alterationem in instrumento factam non percipit, spiritus enim est veluti attonitus, quare non imaginari, non ratiocinari, non meminisse potest: Hoc evenit etiam in intensioribus animi cogitationibus; nec enim videmus, nec audimus, apertis etiam oculis & auribus, sensibilibus tamen oblatio & instrumentorum alteratio non accusanda. Dicimus autem motum convulsivum, vera enim convulsio non est, nam motus est interpolatus & cum functionum principum & minus principum vitio conjunctus, quod alienum à vera convulsione; interim in hoc conveniunt, quod uterq; à facultate motrice lacerata proficiscatur; sibi soli enim relicta non nisi *ωγαγέτως* movet

SUBJECTUM primarium
πρώτον δυνάμιον est cerebrum
3. loc. aff. 7. adæquatum vero
& denominationis totum
corpus. Nam cum actiones
animales in omni epilepsia,
modò sit legitima & exquisi-

SUBJECTUM primarium
est caput *Paracels l. 3. paragr. c. 1*
§. 1. principium n. paroxysmi
est in capite: & nisi cerebro
affecto nunquā paroxysmat
epilepsia *id. t. 4. tr. 1. de morb.*
ament.

ta, præ vitalibus & naturalibus maximè laborent, (quod patet ex totius corporis concussione & sensuum læsione) organum etiam ipsorum præ reliquis affici demonstrant. Cor quidè in consensum nonnunquā trahitur, quod palpitantes, animi deliquia, pulsuū perversiones &c. demonstrant indè tamen cum *Quercet. in tetrad.* pro parte primariò affecta non obtrudendum; nam & sic in hypochondriaca, cardialgia, uteri suffocatione &c. in quibus maximè laborat cor, pars primariò affecta esset. Quid quod etiā pluribus in ipso paroxysmo ventriculus subvertatur, semen profluat, excrementa deiciantur, pro primariò tamen subjecto illæ partes hinc habendæ non sunt. Et licet multæ dentur epilepsie, citra ullam imaginationis, phantasie aut memorie læsionem, salvis
etiam

etiam visu & auditu, tamen evenit hoc saltem in spuris, in quibus vis non est tanta, ut etiam facultates principes & sensus lædat, sufficit, si aliquales saltem convulsiones excitet, quarum certè cor non est autor quia nec motus animales secundum naturam imperat. Quod autem una afficitur cor, fit, vel quod materia peccans à cerebro expulsa cor di etiam communicetur, vel quod ob respirationem impeditam fuligines & sanguis collectus cor angustent, vel quod mali fomes & causa antecedens in corde lateat ex obf. *Donat. Marcel. l. 2. hist. med. mirab. c. 4.* vel quod vapores maligni versus caput tendentes cor in transitu lædant *Holler. l. 1. de morb. intern. c. 15. in Schol.* Afficitur autem cerebrum primario non secundum medullarem ejus substantiam *4. loc. aff. 2.* nec ut ventriculis distinctum, sed secundum membranam tenuem per totam cerebri amplitudinem, ventriculorum parietes & basin cerebri extensam. Eatenus enim exquisitissimi est sensus, adeò ut vel ad auram molestantem insurgat, & sternutamentum cieat; per accidens quidem substantia etiam secundum poros ex constrictione læditur.

CAUSA PROXIMA & immediata est irritatio facultatis expultricis membranarum cerebri & principii nervorum. Magna quidem de hac causa est controversia, dissentientesque opiniones *Hipp. l. de morb. sac. sanguinis refrigerationem & motum ejus in venis impeditum, aerisque receptionem denegatam, à pituita in utero collecta, liquata & venis ex capite infusa causatam, proximam causam statuit lib. verò de flat. obstructions venarum partiales à crasso flatu accusat.*

CAUSA PROXIMA est vellicatio & constrictione membranarum cerebri. Cum enim in meningum genere, quæ exquisitissimi sensus sunt partes in cerebro, acrimonia, malignitate & virulentia ex partes erodi compungi & acriter tendi sentiunt, fit, ut inopino insultu violentoq; cerebrum cum causa morbifica confligat ac colluctetur, hacque ratione sese contrahat, ac veluti in sua arma colligat, ut à vellicantis materiæ offensio- ne sese tueatur, undè spasmi

Galenus vero ad partialem ventriculorum cerebri à crasso humore factam obstructi-
onem recurrit, ob quam animalis spiritus nequit in nervos influere, undè natura impedita, arctius oppressa, nondum tamen prostrata onus
q̃. excutiens, caput corpusque vehementer concutit, dum soluta obstructione infarctum humorem excutiat, hinc apoplexiam & epilepsiam cognatos affectus facit 2. *aph.* 45. utpote qui eundem locum occupant, & eundem humorè habent mali causam, differunt saltem secundum magis vel minus. Verum an sola perfrigeratio sanguinis, ejus motus aërisque receptio impedita epilepsiam possit inducere, dubitamus! Et si sola pituita esset causa, qui fit, quod biliosi quoque ea corripiantur, ex ira etiam, odoribus, inedia &c in eam incidant. Obstructio autem locum habere nequit: Oporteret enim motum in universum prohiberi vel imminui, quantitate spirituum, qui transeunt, non sufficiente ad partes inferiores movendas; obstructio enim ut obstructio tantum valet alicujus substantiæ aut facultatis distributionem lædere aut impedire. Sed vehementior, quàm ante, apparet concussio & motus inæqualitas. Et quomodo tanta humoris frigidi copia potest colligi, ut uno momento obstruat ventriculos, præsertim separatos per corpus callosum, & in diviso cerebro locatos, ut de uno in alium motus sit difficilis? Et certè cum apoplexia & epilepsia ad diversas motus læsi species pertineant, species etiam diversas causas obtinebunt. Sternutatio autem singultus & epilepsia cognati affectus sunt 3. *loc. aff.* 7. undè etiam *Avicen.* sternutationem parvam epilepsiam vocat; at sternutatio non oritur à viscidis humoribus obstruentibus, sed acrem potius vaporem anteriora cerebri vellicantem emittentibus, unde natura molestum excussura hunc motum

& cōvulsivi motus excitatur
Querc. in tetrad. Quia v. vapores & spiritus sales hinc inde velut in magna tempestate venti & nubes feruntur, reliquis spiritibus commiscetur eosque turbant *Pet. Job. Faber in myrothec. spag. c. 30.* principum facultatum & sensuum functiones etiam læduntur.

ciet : sic & verisimile epilepsiam à simili causa sc. vellicatione potius membranarum cerebri & principii nervorum, quàm ventriculorum obstructione excitari. Quid quod epilepsia sæpius nascatur *συμπληρωσις* ex aura frigida saltem ascendente *Gal. 3. loc. aff. 7.* ex aëre etiam & vento concepto *Rondelet. l. 1. cur. morb. c. 36.* ex vapore, cujus causa multi interierunt *Fernel.* abscessu cerebri aut meninge corrupta mephytinolente *id. 5. de part. morb. & sympt. 3. 2. de abd. rer. caus. 15.* ex ira, inedia *Gal. 5. loc. aff. 6.* in quibus tamen talis obstructio ventriculorum cerebri non acculanda. Tota autem de obstructione partiali sententia falsa nititur hypothefi. Galenus enim in ea fuit opinione, ventriculos & pro spirituum generatione & pro eorum conservatione constructos esse, ut videre est *ex l. 7. de plac. c. 3. l. 3. loc. aff. 5.* Hinc illis obstructis spirituum in nervos *Ἀγδωσι* impediri, & sic motum animale vel prorsus auferri, ut in apoplexia, vel imminui, ut in epilepsia. Verùm longè aliud ventriculorum structura & spirituum natura nos docet. Excrementorum enim potius, quàm spirituum sunt receptacula, unde naturaliter aqua & pituita in ventriculis hæret *Clariss. Slegelius, Præceptor quondam noster honorandus in demonstratione anatom.* Cum enim caput in suprema corporis nostri parte locatum velut tectum domus calidæ ex *Gal. 9. us. part. 1.* ex inferioribus partibus ascendentes vapores recipiat, quos præ imbecillitate coquere & discutere nequit: ex sanguine etiam in cerebro tum pro nutritione, tum pro spirituum animalium generatione ulterius elaborato excrementa separentur, locus aliquis pro horum collectione erit concedendus; nam ubi natura communem coctionis officinam instituit, receptaculum excrementorum propè apposuit; Hic autem commodissimus erunt dicti ventriculi; unde infundibulum etiam adjecit sagax natura, ut in palatum, os ac nares omne alienum in cerebro humidum descenderet. Hanc sententiam confirmant etiam sectiones; plurimorum enim ventriculi excrementitio humore penitus repleti inventi fuerunt, ut in hydrocephalis, indè tamen neque epilepsia neque apople-

xia inducta *Vesal. human. corp. fabr. l. 1. c. 5. Gvilb. Fabric. cent. 1. obs. 12.* Contra verò epileptici post mortem secti nullam obstructionis notam monstrarunt. Quomodo autem hæc causa proxima sc. irritatio & vellicatio, motum convulsivum excitet, explicatu difficillimum: sed dicamus, quantum in hac rerum caligine assequi licet. Cum materia epileptica ad membranas & nervorum principium transmittitur, tanquam partes maxime sensiles pro innata potentia eas vellicat & molestat. Hinc vis expultrix excitata insurgit, ut noxam à se depellat, cerebrum dilatat atque comprimit, atque ista compressione, quod sibi molestum, excutere conatur; quemadmodum etiam in sternutatione, quæ ideo *Avicenna* parva epilepsia dicitur & singultu agere consuevit. Verum, quia ad hujus noxæ depulsionem sufficiens non est, animalem etiam in consensum trahit, idque magis, quod ipsum etiam principium facultatum laboret, quæ molestata ob irritationis vehementiam, totius animalis salutem, & eam, quæ est in toto corpore, sympathiam partium & actionum, obsequi cogitur, & hunc motum coacta seu permittit seu imperat, quem non coacta nec permisisset nec imperasset, sibi soli enim relictæ non nisi *ωγαργέτας* movet. Quia autem principium nervorum patitur, *τα πνεύματα* etiam, nervi scil. & muscoli in consensum trahuntur, qui omnibus viribus allaborant, ut noxa cerebri depellatur, non quia ipsi à causa morbifica semper obsessi, sed quia principium nervorum patitur *Carol. Piso tr. de colluv. ferof. obs. 24. p. 107.* Consensum hunc videmus etiam in sternutatione; ex levi enim partis anterioris cerebri irritatione muscoli thoracis in consensum trahuntur, & ad expellendum insurgunt; ex puncto etiam nervo totum aliquando convellitur. Motum autem hunc fieri cooperante facultate animali, patet; nam illa contractio & extensio musculorum est actio propria, muscoli autem sunt organa facultatis animalis; à causa morbifica non fit illa contractio & extensio, nam morbus & anima eundem motum non producant. Interim tamen læsam esse omnino concedendum est. Sed dicēs: morbum hunc ex irritatione

non

non posse provenire, quia periit sensus tactus, & hinc appetitus salutare prosequendi & noxium fugiendi. Verum utut sit de tactu, cujus vestigia, licet sub ratione confusa, remanere statuo, irritationem tamen causam esse posse puto. Nam ad illam percipiendam non semper facultas animalis requiritur, sed sufficit naturalis. Nam undè quæso singultus, ab animali ne an naturali facultate irritata? Dolorem & molestiam rei vellicantis non sentimus, interim motum præternaturalem expultricis observamus. Sic humores viticosos in crisi separatos, aut à purgante medicamento attractos natura tanquam noxios expellit, procul dubio ante laceffit, quod symptomata crisi antecedentia demonstrant, indè tamen appetitum animale excitatum fuisse nemo dixerit. Proindè etiam in epilepsia irritationem posse consistere, sensu licet ablato, putamus? motum autem convulsivum insequentem facultatis motricis esse opus statuimus. Nec tamen absonum videtur, inferiorum motum convulsivum ex propria nervorum & musculorum passione deducere. In illa enim cerebri contractione, quæ in infantibus tactu etiam deprehensa, materia vaporosa aut substantia immaterialis, ad nervos & indè musculorum principia detruditur. Undè etiam diutius durat paroxysmus, si motus convulsivus omnino non inhibetur, causa enim peccans non potest dissipari. Hinc muscoli etiam lacessiti insurgunt, & ad suum principium retrahuntur. Quia tamen materia illa est vaporosa aut admodum tenuis & facile discutitur, contractio illa est saltem momentanea & ob tam extendentes, quàm contrahentes musculos affectos fit in utramque situs differentiam.

<p>CAUSA CONTINENS est substantia acris & peculiaris vi cerebro infesta membranasque cerebri & genus nervosum vellicans. Crassa autem an tenuis sit dubitant. Crassam vult <i>Hip. l. de morb. sacr. Gal. 3. aff. loc. 5. 2. sympt.</i></p>	<p>CAUSA CONTINENS est vapor & alis, malignis & virulentis qualitatibus stipatus. Per & autem hinc intelligimus partem maximè volatilem, penetrabilem cujuscunque rei, quæ proportionem tertio principio hypostatico</p>
--	---

caus. 7. 3. m. m. 2. l. de atr. bil. 5. 2. aph. 45. Æginet. l. 3. c. 13. & alii. Verum cum citò fiat, citoq; solvatur, nullo relicto sui vestigio, nec insigni evacuatione subsequente, etiam si centies una die paroxysmum excitet, evidens etiam damnum extranslata ad partes materia non oriatur, tenuis potius, quam crassa erit statuenda; hoc signum enim materiae tenuis ipse *Gal. ponit l. de trem. & palp. c. 5.* Accedit, quod saepissimè oriatur ob victum tenuem, vaporosum, vinum fumosum *Holler. l. 1. morb. inter. c. 15.* bilem, undè multis etiam solvitur morbus per vomitum biliosum *id. in schol. ad c. 16.* ab aëre, vaporibus & odoribus pravis, ut suffitu succini, galbani, cornu caprae, hepatis hirci, ellychnii extincti &c. in quibus tamen nulla crassities accusanda. Clarissimè hoc probant epilepsiae per sympathiam, quae etiam frequentissimae; in illis enim veluti auram frigidam ascendere aegroti sentiunt, quod tamen humori crasso competere nequit, motus enim sursum est ipsi p. n. Igitur *πρόματιν* potius *τις σόια, ὡς αὐτὴ ἀύρα*, quae mole minima virtute verò maxima sit, cum *Pelope*, aut tenuis humor, quàm crassus causa epilepsiae statuenda. In idiopathica tamen major aliquomodo crassities, quàm in sympathica concedi potest. A credini autem & mordacitati hujus materiae maligna quoque proprietas, membranis cerebri & nervoso generi peculiariter infesta, quae veneni instar perpetuas q. inimi-

ci-
 respondet, & secundum mineræ suæ ideam variis & diversis signaturis se prodit, undè modò constringit, stupefacit, modò vellicat, mordet & alia efficit, prout sc. ex minera salina, sulphurea aut mercuriali elevatur *Paracels. t. 4. p. 253.* Interim tamen principium mercuriale in hoc præpolleat necesse est, alias non esset vapor & alis, sed vel \ominus inus vel Δ eus: impressas tamen reliquorum tincturas habere potest, prout etiam in \ominus Δ eo Δ , in mercuriali vero mercur. se prodit. Hinc etiam rectè *Paracels. quot species mercurii, tot etiam species morbi caduci seu differentiae. Paracels. t. 3. l. 3. paragr. c. 2. §. 3. r. 5. p. 213. Severin. id. med. p. 315. Scheuenem. med. ref. c. 3.*

citias nervoso generi juravit, conjuncta sit, necesse est, *Fern. l. 5. part. morb. & sympt. 3. 2. abd. rec. caus. 15.* qualem ipse *Gal.* in uteri strangulatiu ex menstruo & semine corrupto orto, concedit *l. 6. loc. aff.* Nam multi dantur morbi, in quibus acres humores & indè exhalantes vapores acres (quod ex subsequenti cephalalgia patet) caput petunt, ut sunt lues ♀, febres ardentes, phrenitis, meningum corruptiones, quibus tamen epilepsia non conjungitur. Videatur *Cl. Sennertus l. 1. pract. part. 2. c. 31. q. 3. Marcell. Donat. l. 2. hist. med. mir. c. 4.*

CAUSÆ ANTECEDENTES sunt omnia, quæcunque specifica illa corruptione sunt infecta & materiam acrem, malignam, cerebroque adversam suppeditare possunt, sive sint partes continentes, ut cranium corruptum & cariosum, meninx corrupta calvæ adhærens, abscessus cerebri *Fern. l. 5. de part. morb. & sympt. 3.* sive contentæ, sc. humores quilibet, sanguis, sive intra sive extra venas contineatur *Gal. 4. ac. t. 27. Avic. fen. 1. 3. tr. 5. c. 8. Zacut. Lusitanus l. 1. hist. 26.* pituita, *Gal. l. c.* melancholia *Forest. lib. 10. obs. 62.* bilis *Costæus*, atra bilis, humores serosi, ut urina stagnans *Heur. de aff. capit. c. 22.* semen corruptum in utroque sexu *Zac. Lus. l. 1. hist. 19.* aut humor femini analogus, qui corruptus veneni naturam induit *Riolan. antropogr. l. 2. c. 34.* vidit enim duabus in virginibus testes pugno grandiores semine putrido turgentes, sanguis menstruus *Hip. l. 3. Coac. t. 12.* sanies in ulceribus, *Fernel. in consil. pro epil. fœtus mortuus, Schenk. obs. 183. l. 1. vermes Quercet. pharmac. dogm. rest. cap 7.* chylus corruptus *Heurn. de capit. morb. c. 22. &c.*

CAUSÆ REMOTÆ sunt quæ ad antecedentium & mediatarum generationem, vel

CAUSÆ ANTECEDENTES sunt radices & minere epilepticæ in corpore latitantes, quæ secundum digestionum suarum tempora tales vapores emittere & fructus producere valent, & sunt humores prærei, mucilaginosi, æruginosi, & lati arsenicales, aluiinosi, armoiaci & ales, &c.

CAUSÆ REMOTÆ sunt omnia illa, quæcunque per corruptionem eam naturam

motionem, vel faciliorem
fufceptionem faciunt, & sunt
tum internæ, tum externæ:
referri autem possunt ad res
naturales, non naturales &
præternaturales.

induere possunt, ut in ærugi-
nosum quoddam, ☉ latū aut
aliud prædictum virus dege-
nerent, aut quæ sua natura ta-
lem succum suppeditant, aut
ad corruptionem illam indu-
cendam faciunt.

NATURALES sunt conceptio aut nativitas silente lu-
na aut in Eclipsi lunari secundum Astrologos videatur *Ptolo-*
meus, aut fluentibus mensibus *Holler. de morb. inter. c. 15.* ætas
puerilis *3. aph. 25.* juvenilis *aph. 29.* oris ventriculi aut cere-
bri naturalis *Caj. Inotia*, cerebrum debile, membranarum
ejus textura nimis rara.

NON NATURALES, & sunt ea quæ ASSUMUN-
TUR, ut aër crassus ex assiduis imbris *3. aph. 16.* cibi cor-
rupti, excrementitii aut peculiari qualitate epileptici, ut
carnes hædinæ, hepar hircinum & caprinum, coturnices, pas-
seres, angvillæ, *Faventinus*, tubera, fungi, allium, porrum, ex
cujus assiduo usu concitaram, & ejus abstinencia sublatam
vidit Epilepsiam *Dorynetius l. 3. apolog. c. 2.* lentes *Jul. Ale-*
xand. l. 8. salubr. c. 7. fructuum horariorum esus, lactis ni-
mia ingurgitatio *Hildesheim. in spicileg. p. 599.* lac nutricis
ira, terrore &c. corruptum, nimia vini generosi ingurgitatio,
medicamenta purgantia fortiora *5. aph. 1.* Odores rerum
foetidarū, bitumis, picis, gagatis *Mercurial. de morb. cap.* Cor-
num, hepatis caprini affati, apii *Avicen. l. 3. fen. 1. tr. 5. c. 11.*
Arnold. de villa nova l. 1. c. 2. Tral. l. 1. c. 15. Plin. l. 20. c. 11. ☿,
☿ subl. &c. Huc referri etiam potest inedia *Gal. 5. loc.*
aff. 6.

QUÆ GERUNTUR ut vehementior exercitatio, præ-
sertim à cibo, otium *5. san. tuend. 6.* somnus post cibum co-
piofum, evigilatio repentina *Capivac. l. 1. pract. c. 16.* nimius
☿ usus, subita animi consternatio ex decollatione *Weinrich.*
l. de monst. c. 15. epileptico cadente *Plater. l. 1. obs. ira 5. loc. aff.*
6. terror ex inopinata aquæ affusione *Hechstetter. obs. 8. dec.*
4. ex tubarum sonitu *Forest. l. 10. obs. 54. in Schol. ex fabella-*
rum

rum & figmentorū enarratione *Mercurial. l. 2. de morb. pucr. c. 3.* hinc rectè *Plato* tales terrores prohibuit *l. 2. de Repub.* ob nuncium triste *Amat. Lus. cent. 2. cur. 90. Montan. conf. 50.* intensior animi cogitatio; *Plater. l. 1. obs. sic Jul. Cesar* cogitabundus sæpius hoc malo laboravit, titillatio, gestatio foetus in utero *Fernel. l. 5. pathol. c. 3. Jacchin. in 9. Ras. c. 14.*

QUÆ RETINENTUR & EXCERNUNTUR: excrementa alvi retenta, urina retenta *Heurn l. 6.* sanguis menstrualis retentus *Hip. f. 3. Coac. t. 12. hæmorrhoides suppressæ &c.*

QUÆ EXTRA ADHIBENTUR, ambiunt & incidunt, calor ☉, radii ☽ res, tempus vernum *3. aph. 20.* autumnale *aph. 22.* balneum *Gabelkoffer. cent. 4. cur. 59.* medicamenti venenosi applicatio *Forest. l. 10. obs. 54. in schol.* corium caprinum crudum corpori appositum &c.

PRÆTERNATURALES sunt vel adventitiæ vel innatæ: adventitiæ sunt intemperies cerebri, calidi innati debilitas *Capivac. capitis ictus Langius l. 1. c. 10.* vulnera, *Valesc. de Taranta,* corruptiones & putredines meningum, quod observavi in tinctore quodam cygneo, abscessus, inflammationes cerebri *Fernel. 2. abd. rer. caus. 15. caries cranii Forest. l. 10. obs. 67. in schol.* ulcus cacoëthes, dētitionis dolores in infantibus, febres humores fundentes *Jacchin. in 9. Ras. c. 14.* Cruditates ib. prava viscerum constitutio, ob quam corpus fit cacoehymicum *Fernel. in conf. pro epilept. & continuo mali fontis nova materia supeditatur.* Ischuria, *Heckstetter. decade 5. cas. 10.* menstruorum obstructions *Hipp. 3. Coac. t. 12. punctura scorpilii, contagium teste Bertino l. 12. suæ med. c. 3.* unde rus ablegabant antiqui suos epilepticos, ne familiam inficerent *Apu-lejus 1. apolog.* venenum assumptum *Gorrhaeus in defin. med.* Innatæ sunt vel hæreditariæ, vel simpliciter congenitæ: hæc proveniunt vel à nutrimento vitioso foetus, vel ex errore formatricis, ut quando uterus relictus imperforatus, ex qua postmodum epilepsia orta *Gvilh. Fabric. cent. 3. sbs. 60.* vel quando ex terrore matris dispositio epileptica foetui imprimitur. Illæ sunt dispositiones epilepticæ à parentibus mediante semine & sanguine in liberos jure hæreditario derivatæ, non ali-

aliter ac sæpiusculè parentum species & individuales secundum naturam proprietates similes unà cum semine in liberos transfunduntur.

Quomodo autem hæc mala in filios deriventur, admodum obscurum; neque enim ratione animæ, neque ratione corporis seminalis hæc propagatio videtur concedenda; non animæ, quia ex se est impatibilis, nec ullis morbis obnoxia, & in anima idea corporis simpliciter considerati, non morbo si hæret; non corporis, quia corpus generatur ex semine & sanguine in testibus & utero elaboratis, quomodo igitur vitium, quod in capite hæret, propagabitur cum semine in vasis spermaticis formato, nisi statuamus, semen ex toto & singulis partibus decidi, quod tamen absurdum. Verum, ut præteream, quod ejusmodi *υδασπαρα* sese multiplicandi vim habeant, si sanguinis motum observemus, facile ex hac difficultate nos extricare poterimus. Nam cum sanguis per singulas corporis partes fluat refluatque, non mirum, si in transitu hujus vel illius partis prava diathesi afficiatur, & *νοσώδεις Αλγεσίδες* secum auferat. Quia autem sanguis hic, qui jam erat in capite, mox lege circulationis potest pervenire ad partes inferas, & sic etiam ad testes derivari, & in semen elaborari, una etiam in semine manebunt morbosa hæc seminaria; nam tales formæ subordinatæ à principali non expelluntur, utpote sibi non contrariæ. Dices: illa particula seminis, si totum non sit infectum, quæ in se morbosum principium continet, est indifferens ad positionem in formatione foetus, ita ut vel manus vel pes, vel oculus, vel aliud quid ex illa possit generari, quomodo E. ab epileptico potest generari epilepticus, si particula seminis epilepticum principium continens non in caput, sed vel in pedem vel aliud membrum est formata? Sed scias: quando tale principium in aliquod membrum est ingeneratum, tunc à forma superiore coercetur, ne illius potentia traducatur in actum, & tunc quietum manens in corpore ejus existentia non percipitur; interim tamen nec hoc omnino otiosum est, sed se ipsum conservare, & per suam speciem se evolvere studet, donec tandem digestio-

stione sua absoluta calore nativo vel debilitato, vel alia causa accedente, quæ superiorem, à qua coërcebatur, infringit, ipsum jam liberum & ad suam maturitatem perductum, se ipsum evolvat, & juxta sui ideam effectum prioris signaturis insignitum producat. Quod autem particula prius in capite, postea vero in pede v. g. existens, eundem producat morbum, causa est propria essentia, quæ non hoc, sed illud membrum respicit, quod ex venenorum varietate videre est. Nam causa epileptica in pede existens non potest producere epilepsiam, nisi capiti communicetur, quia aliàs non potest fieri motus convulsivus totius, nisi affecto principio motus. Nec etiam alium producit morbum in pede, quia nervorum principium afficere natum est, non aliud membrum; & si evolveretur in pede, nec tamen capiti communicaretur, non fieret epilepsia, sed levis quidam convulsivus motus partis determinatæ.

Ad DIFFERENTIAS accedimus: variæ autem ex sunt; præcipuè tamen sumuntur à genere, subjecto & causis:

I. Ratione GENERIS alia est simplex, alia composita; simplex, quæ nullo alio morbo comitatur: composita, quæ cum alio affectu v. g. melancholia, *Horst. l. 2. obs. 8.* syncope, suffocatione uterina *Forest. l. 10. obs. 30.* est conjuncta. Ultraque autem est vel exquisita vel spuria: exquisita, quæ est universalis, & cum principum facultatum abolitione vel magna imminutione, quam supra definivimus. Spuria, quæ est particularis, qua non totum corpus convellitur, nec æger concidit, sed qua aliquæ saltem partes convelluntur, & vel caput tantum concutitur *Holler. l. 1. morb. intern. c. 16. in schol.* vel oculi contorquentur, vel manus *Casalpin. l. 5. art. med. c. 29.* & pedes hinc indè jaçantur, vel manus clausæ tenentur *Dodonæus c. 97. obs. med. in schol.* vel æger in chyum agitur *Erasr. in anatom. comit. Mont. part. 2. pag. 195.* aut hinc indè discurrit, stat *Beniven. de abd. rer. caus. 97. sedet ib.* nec concidit *Marcell. Donat. l. 2. hist. med. mir. c. 4.* nihil interim loquitur, audit, sentit *ib.* vel exigua aut planè nulla facultatum principum læsio adest, recordatur quæ acta sunt *Brunn. cons. 14.* quæ

C

ali-

aliquando vertigini est finitima *Fernel. 5. de part. morb. & sympt. c. 3.* Alia est gravior, alia mitior, pro symptomatum ratione: alia recens, alia inveterata: alia periodica, quæ certam habet periodum, ut illius ancillæ à *Strawenprishnit*/ quæ ante quatuor annos hîc vagabatur, quæ alternis diebus epilepsia corripiebatur, alia est erraticæ: alia est frequens, ut in *Mercatore* quodam *Egrano*, qui singulis ferè horæ quadrantibus epilepsia corripiebatur, observavi, alia est rara, &c.

2. Ratione SUBJECTI: alia fit per primarium cerebri affectum & est idiopathica, quando sc. causa antecedens in ipso cerebro stabulatur: *Ranchino tr. de morb. sub. c. 2.* dicitur humoralis: alia sympathica, quæ accidit sine primario cerebri vitio causa ex inferioribus ad cerebrum derivata: eadem dicitur vaporosa Idiopathica autem est duplex: fit n. vel per protopathiam, vel per devteropathiam; per protopathiam, quando causa morbifica in parte affecta ejus vitio generatur, vel etiam immediatè ab extra in eam immittitur. Per devteropathiam fit, quando alterius partis vitio cerebrum afficitur, translata vel transplantata causa ab aliquo loco in cerebrum relictâ priore radice, foco & seminario, quod contingit vel per *διαδοχην* criticam, vel *μετάσθεσιν* symptomaticam. *Horst lib. 2. obs. 10.* Sympathica est, quæ sine ullo præcedente cerebri vitio contingit ob partis alterius morbum. Fit autem vel per epigenesin, cum causa morbifica per venas, arterias vel nervos à priore foco adhuc subsistente transmittitur in cerebrum: vel per simplicem communicationem, vel similitudine generis, aut societate operis, vel communione vasorum. Sympathica contingit vel ob totum vitiosum, vel ob partem: ob totum, quando sanguis in totius venis est corruptus & tetrum vaporem in cerebrum mittit *Capivac. l. 1. pract. c. 16. Crato in consil. Scholtz 42.* id quod etiam in febribus contingit, & variolis. Pars autem est vel interna vel externa. Interna, ut ventriculus *Gal. 5. loc. aff. 5.* lien *Holler. in schol. ad c. 16. l. 1. de morb. inter. hepar, Cor Marcel. Donat. l. 2. hist. med. mirab. c. 4.* Intestina *Jul. Cesar. Claudin. consult. 64. Quercet. in pharm. dog. c. 7.* uterus, sive quod foetus vivus
in

in eo gestetur *Fernel. l. 5. part. morb. 3. sive mortuus Forest. l. 10. obs. 66. in Schol. sive quod secundina retenta, sangvis menstruus in eo restagnet Forest. ibid. vel jam fluat, seu quod sit imperforatus Guilb. Fabric. cent. 3. obs. 60. Vesica Heurn. de morb. capit. c. 22. Testes & vasa spermatica Alzabaravius lib. pract. tr. 1. s. 2. c. 34. Domin. Leon. l. art. med. 14. Thom. à Veiga l. 6. loc. aff. com. in c. 5. Externa pars potest esse vertex Fernel. 5. pathol. 3. labrum superius Dovynetus l. 3. apolog. c. 2. articulus humeri, brachium Favent. c. 11. de med. morb. Pollex manus Zacut Lusitan. l. 1. hist. 20. minimus digitus Holl. l. 1. morb. inter. c. 16. in Schol. manus dextra ib. sinistra Hechstetter. decad. 4. cas. 7. pes Trallian l. 1. c. 15. Sura Holler. ad c. 16. l. 1. Coxa Gattinaria &c.*

3. Ratione CAUSARUM, alia est hæreditaria, alia adventitia: alia provenit à causa externa, alia ab interna: alius causa autecedens est humor biliosus, melancholicus, alius sanguineus, phlegmaticus, serofus; alia ex femine, vermibus, cranio carioso &c. alia fit cum communicatione materiæ, alia cum communicatione qualitatis seu speciei spiritualis. Reliquas differentias tanquam minus ad curam utiles, sponte præterimus.

Restant SIGNA. Hæc autem sunt vel diagnostica vel prognostica. DIAGNOSTICA vel imminemtem affectum denunciant, vel præsentem manifestant. IMMINENTIS signa sunt oculorum caligo, somnia turbulenta, pavor in somno, membrorum trepidatio, inordinatus lingvæ motus, memoriæ læsio, capitis versatio, dolor, gravitas, aurium tinnitus, pallor faciei, urina cruda, tenuis *Forst. l. 10. obs. 62.* PRÆSENTIS signa pulchrè explicat *Aræteus l. 1. c. 5.* & sunt pathognomonica casus subitaneus, motus corporis concutiens & convulsivus varius, detentio functionum principum: Epiphænomena spuma circa os, seminis, fecum alvi aut urine involuntaria excretio, interdum adest magna vociferatio eaq; inconcinna, dentium stridor, sonitus cum stertore, respiratio angusta & offendens *4. aph. 68.* Et hæc sunt signa legitimæ & exquisitæ: Spuriæ verò & partialis sunt mitiora, adest enim

interdum partialis tantum convulsio, sc. capitis, oculorum, manuum, pedum hinc inde discussio & alia leviora, quæ supra in differentiis dicta. Reliqua signa differentiarum ratione GENERIS ex medici observatione & ægri relatione facile patescunt.

SIGNA DIAGNOSTICA ratione SUBJECTI.

In IDIOPATHICA adest ingens & continuus ferè capitis dolor & gravitas, mentis, sensuum & motus stupor, insomnia sunt turbulenta, præcedit plerunque vertigo tenebri-
cosa, oculorum caligo, frequens aurium tinnitus, & alia capitis per se affecti signa adsunt. Paroxysmus crebrius affligit, sine ulla ferè mali presensione hominem corripit, paroxysmus est longior, cum vehementioribus symptomatibus, in partibus etiam inferioribus nullum evidens vitium deprehenditur, quod hujus mali causa statui possit, nec vapor, ante paroxysmum ad caput ascendens sentitur: intervallum est impurum, plerunque manet gravitas & oblivio, frequentius circa novilunium & plenilunium invadit, spuma in paroxysmo est copiosior, venæ sub lingua sunt virides secundum *Avicen.* SYMPATHICAM arguunt, si cerebri per se affecti signa absint, si sc. extra paroxysmum cerebri actiones non ita vitiantur, si pars aliqua inferior præ cæteris vitio laboret, vapor vel aura ante paroxysmum per continuatas partes in cerebrum ascendere videatur, cujus etiam impetus incipiens injecto vinculo arctiori cohiberi aut imminui potest. Paroxysmus est brevior, symptomata etiam non ita vehementia, ob oculos non nulla quasi spectra versari videntur, ut in suffusionibus incipientibus. In specie sympathica ratione COR-
DIS, conjunctam habet ejus palpitationem, tremorem, anxietatem, animi deliquium, pulsum varium &c. Sympathicam ratione VENTRICULI arguunt ejus rofiones, turbationes aut dolores, cardialgia, gravitas aut tensio circa præcordia, coctio debilis, adsunt ructus, difficilis inedia tolerantia, præsertim si ab *ἐναρσινία* ventriculi oriatur, præcessit cogitatio inedia, cumque accessio proxima est, nausea, cordis dolor, animi defectio & contractio labii inferioris ac-
ci-

cidit : post paroxysmum sequitur vomitus, plerumq; bilio-
sus aut alius corruptus, quo accedente, paroxysmus etiam
cessat. Ab INTESTINIS si provenit, adsunt eorum tormina,
in paroxysmo magis ventrem dejiciunt : plerumque autem
oritur ratione vermium in iis contentorum, quos monstrant
præcedens dentium stridor, tremor membrorum, terror &
clamor in somno subitus, narium pruritus & frictio, salivæ,
præsertim nocturno tempore, ex ore effluxus, facies pallida,
mox tamen incalescens & rubens, morsus & dolor ventricu-
li & intestinorum, abdominis frequens contrectatio, rugitus
& tormina ventris, ejus insolita durities, atrophia membro-
rum, tussis sicca, foetor oris, singultus, vermium cum fecibus
ejectio. Ex HEPATE sympathiam monstrant dolor in de-
xtro latere, adsunt signa hepatis affecti vel obstructi &c.
Ex LIENE si est, declarant habitus corporis melancholicus,
præcessit victus crassus, excrementitius, in sinistro latere sen-
sus gravitatis aut doloris percipitur, consveta sanguinis me-
lancholici per hæmorrhoides evacuatio est suppressa, color
faciei est lividus, præcessit vel jamdum adest morbus melan-
cholicus. Sympathiam ex UTERO designant dolor circa
uteri regionem in pectine, in utroq; inguine, in dorso; abdo-
minis crebrò à flatibus fit distensio, respiratio difficilis, cordis
palpitatio, dolor capitis adest, & alia, quæ suffocationem
uteri sequi solent, conjungitur seminis aut menstruorum,
secundinarum vel foetus mortui retentio aut alia supra dicta
adsunt. Epilepsia ex sympathia PARTIUM EXTREMA-
RUM cognoscitur ex affectu illarum partium, ex aura vel
vaporem adscendente, quæ nunc cum stupore, nunc cum tre-
more, nunc cum muscoli alicujus cōtractione incipit *Cæsalp.
art. med. l. 5. c. 29.* interdum præcessit vulnus, contusio, ulcus
aut morsus animalis venenati in ea parte *Sen. l. 1. præf. p. 2.
c. 31.* dolor item aut tensio ante paroxysmum percipitur,
superinjecta vincula paroxysmum instantem vel tollunt,
vel minuunt.

Signa CAUSARUM ex propriis indiciis patent; humor
pituitosus cognoscitur ex facie pallida, ætate puerili, tempe-

ramento frigido & humido, victu tali, anni tempore frigido humido, somno profundiore & longiore, crebra expuitione, narium muco copioso, ingenii stupiditate &c. Melancholicus ex antecedente victu crasso & feculento, mœstitia, temperamento frigido & sicco, anni constitutione tali, insomnia adsunt terribilia, spuma est exigua. Bili plerunque conjunctum est delirium: atra vero furores. Semen continuam, facit in venerem propensionem, illo etiam emisso, cessat epilepsia *Alzabaravius l. pract. tr. 1. f. 2. c. 34.* plerumque effluit in paroxysmo. In vapore adest tinnitus aurium, paroxysmi sunt leviores, minusque diuturni. Et ne in magnam molem excrecant theses, reliquarum differentiarum signa consultò præterimus, & ad prognostica transimus.

PROGNOSTICA SALUTIS. Epilepsia quidem ex se lethalis non est, accessionum tamen continuatione & symptomatum frequentia interdum jugulat, hinc ratione GENERIS omnis periculosa: periculosior tamen in qua functiones animales valdè sunt læsæ, convulsio est vehementior, quæ recens continenter & validè cum anxia respiratione recrudescit, & si desinat in altam quietem, nec à remediis sternuat æger, spumaque absterfa sæpius recurat cum stertore, immemorque actorum si surgat, & si ex improvviso concidat: talis enim plerunque est lethalis; valdè etiam periculosa, quæ fit cum tinnitu aurium, clamore, stridore dentium, ejectione seminis, & vix curatur *Holler. l. 1. de morb. int. c. 15.*

Ratione SUBJECTI: Epilepsia per primarium cerebri affectum deterior, quàm sympathica: sic universalis, quàm particularis, & quo partes præstantiores in consensum trahuntur. Gravidam epilepsia corripit malum: sic & infantes vix à nativitate epilepsia correpti rarò evadunt *Forest. obs. 57. l. 10.* in senibus verò eveniens rarò curatur *2. aph. 39.* una tamen vel altera historia extat apud *Trincavell. l. 1. c. 29. Forest. l. 10.*

Ratione CAUSARUM. Epilepsia hæreditaria rarò vel nunquam curatur *Holler. l. 1. c. 15.* ex pituita aut humoribus tenuioribus orta facilius, difficilius quæ ex atra bile curatur, ut & si oriatur à veneno scorpionis aut alio, seu ob innatam quandam

dam dispositionem pravam; à vermibus difficulter etiam expugnatur, salutis tamen spes est; magnam inanitionem sequens, plerunq̃ue lethalis *Forest. l. 10, obs. 62.*

LONGITUDINIS. Plerunq̃ue est morbus longus, precipuè si accessiones habet raras. Et si nec pubertate, nec menstruorum prurptione nec puerperio solutus fuerit, ad mortem sæpè comitatur *3. apb. 28.* Ante pubertatem eveniens, curabilis, post annum vero 25. invadens, ferè ad mortem usq̃ue durat.

MODI EVENTUS. Plerunq̃ue cum vitio partis terminatur; hinc pulchrè *Arctaus* : epilepsia quæ cum ætatis flore evanescit, abiens q̃s. pulchritudinem invidia quadam deformat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens aut sensum aliquem auferens. Puerulis epilepticis ulcera, scabies, pustulæ prorumpentes, bonum; terminantur enim ejus paroxysmi *Hip. l. de morb. sac.* Juvenes tum ætatis mutatione, tum loci & victus liberantur si sc. ab innata intemperie fiat *2. apb. 45.* & in pueris ♀ usus, in puellis menstruorum fluxus morbum tollit, si sc. per sympath. In senibus plerunq̃ue in æque gravem affectum desinit, ut in illo, cujus *Trincavel. l. 1. conf. 29.* meminit, in scabiem enim leprosam terminabatur aut, in cœcitatem *Gvil. Fabr. l. 5. obs. 5.* Epilepsia gravidarum magna ex parte à partu cessat *Æginet. l. 3. c. 13.* nisi sit inveterata. Comitiales magna ex parte fiunt melancholici *3. loc. aff. 7.* unde etiam quartana superveniente, liberantur *Gal. l. 6. Epid. in fin.* Accessiones sæpius repetentes & longæ & vehementiores in apoplexiam transcunt *Casalp. l. 5. art. med. c. 29.*

CURA. Difficilis autem est ejus curatio. Et qui Hercules hunc morbum semper profligare novit, æquales cum *Hip.* ob depulsam ex Illyria pestem honores meretur. Undè *Menecrates*, teste *Athen. l. 7. dipnosoph.* celebris hujus morbi medicus, nunquam in publicum, nisi suis, quos curaverat, habitu Deorum vestitis stipatus, ipse vero purpura vestitus, aurea corona decoratus, crepidatus, sceptrum deniq̃ue in manibus gerens, velut alter Jupiter, prodire solitus est. Est

au-

autem hæc curatio vel therapeutica vel prophylactica: hæc causam antecedentem, seminarium & radices respicit, & ne novus paroxysmus generetur, prohibet: illa ipsum morbi insultum, paroxysmum & fructum sibi curandum proponit.

Paroxysmus jam jam instans sui inhibitionem, præsens verò remotionem indicat: quod perficitur, si causa epileptica intercipitur, revellitur, derivatur, evacuatur, dissipatur, contemperatur, fervor spirituum sedatur, venenosa & virulenta acrimonia corrigitur, cerebrumque & affectæ partes corroborantur. Perficitur hoc remediis tum internis, tum externis. Instans inhibetur, per ligaturas convenientes partium exteriorum, si sc. per consensum sit, per exhibitionem *pilula de laudan. epileptic. ol. cast. aut succini in aq. approp. pulv. alicujus epileptici* per inunctionem narium cum *bals. rut. succin. castor. &c.* Præsens vero sequenti modo tractandus. Ager igitur statim collocetur loco lucido & mediocriter calido, capite aliquantulum elevato, inclametur proprio nomine, hinc dentes constricti diducantur, spuma abstergetur & ex ore evellatur, sacculus *rutæ, sinapi, pyrethro* & castoreo plenus & *oxymel.* intinctus interferatur, quo sic aeri liberior pateat ingressus, spumæ egressus, linguaque ex præcisione non periclitetur. Membra convulsa leniter ad naturalem situm reducantur, & in eo absque tamen violentia, teneantur (in totum verò prohibere motum convulsivum nihil aliud est, quam paroxysmi solutionem retardare; nam per illam partium concussionem materia partes gravans discutitur *Rondel. m. cur. morb. c. 36.*) & inungantur cum tota spina *ol. anodynis, nervinis & res solventibus* vel *aquis specificis*; refrigerata calefiant. Pro revulsione instituantur frictiones à superioribus ad inferiora descendendo, ligaturæ fortiores dolorificæ, compressiones pollicis, evulsiones pilorum, puncturæ in partibus præsertim extremis, cucurbitulæ scapulis, hypochondriis, poplitibus vel malleolis, aut etiam regioni uteri grandior quædam apponatur, prout sc. ob hujus vel illius partis consensum oritur: plantæ pedum sale & aceto te-

ran-

rantur, sinapismi iisdem illinantur; peculiari proprietate malignitatem epilepticam allicere dicitur *turtur fœmina* depumata, ex observatione singulari *D. Brunneri*, si umbilico applicetur, ipsa enim postea convulsa moritur. Si malum ab inferiore ventre originem sumit, injiciantur *clysteres* aciores revellentes additis specificis, aut talia suppositoria intrudantur, quibus commodè *crocus metallorum* adjici potest. Nonnulli, ut *Celsus*, in paroxysmo *venam* revulsionis gratia secant, quod etiam singulari experimento & observatione probat *Zac. Lus. l. 1. hist. 26.* in viro plethorico, id quod etiam suadet *Valleriol. 3. obs. 7. Vega l. 3. art. med. c. 12. s. 1. Mich. Johan. Paschalius & ejus Scholastes Pereda l. 1. de cur. morb. c. 8.* Postea materia derivetur & evacuetur, lingua & palatum illinantur *theriaca, mithridat. confect. anacard. diacastor. cum sinapi, piper. long. suc. ruta* & aliis attrahentibus mixta. Utilia quidem hîc essent masticatoria, sed præ morbi vehementia illorum usus non conceditur. Si malum oriatur vitio ventriculi, provocetur vomitus per pennam *ol. amygd. d. irin. oxymel.* intinctam & faucibus immissam, quod fieri potest in infantibus, qui tamen prius in ventrem dirigendi. In adultioribus verò commoveri potest per *aq. bened. specif. hemet. Conradi, croc. metal.* ☉ ☉ *li; gillam Paracelsi, aq. pœon. aut infusionis ungula alcis* mixtam; si verò prohibeatur hæc evacuatio, statim adhibeantur, quæ orificium ventriculi exactè claudunt. Mox quæ causam discutiant & attenuant in usum revocanda. Lingvæ igitur & palato illinantur *bals. ruta, succin. extr. ruta, theriac. mithridat. confect. anacardina,* ☉ *simplex & ruta* aliorumque antepilepticorum; naribus admoveatur *ruta præf. sylvestr. vel saturea* cum aceto fortissimo, qua plurimos excitasse se scribit *Forest. l. 10. obs. 58. in Schol. ejus succus, oleum ut & succini, camphor. balsama eorum, majoran. zedoar. organ. rosmar.* ipsis infletur pulvis sternutatorius ex *fl. lil. convall. helleb. castor. euphorb.* ☉ ☉ *li,* qui sat fortis sit. Excitentur etiam odores ex *succin. peuced. succ. Cyrenaic. vel ex rebus fœtidis,* si sit ex utero &c. Auribus indatur *ol. Cinnam. caryophyl.*

phyl. salv. majoran. philosoph. castor. Tempora, aures, ver-
 tex, futura coronalis ungatur *ol. & bals. roris mar. lavendul.*
majoran. succin. de peru, ol. de cran. hum. Vertici & futuræ
 coronali applicentur *sacculi, emplastra, cataplasmata* ex discus-
 sientibus cephalicis & specificis. Interim non omittantur
 specifica interna, quæ etiam pro malignæ & acris qualitatibus
 extinctione faciunt, ut *castor. cum oxym. & suc. Cyrenaic. mist.*
aut mistura ex theriac. confect. de hyacinth. aq. pæon. ceras. nigr.
 quæ infantibus commoda, *aq. hirund. picar. epilept. Quercet.*
Lang. Hartm. sang. hum. Poppü, theriacal. sp. fl. tilia,
ceras. nigr. lib. convall. rut. cerebr. hum. Excell. D. Rolfinckü Prä-
ceptoris ac Promotoris nostri filiali observantia, & honore etatem
colendi, Hartman. Cran. hum. C. C. & volat. imprægn. sp. epilept.
f. & comp. Plater. sp. & li volat. sp. & li comp. arcanum ungu.
alc. tinct. corall. smaragd. extractio D antepilept. *ol. succin. cam-*
phor. ruta, cran. hum. heraclin. & li rubr. extr. castor. rut. pæon.
sacch. succin. castor. major. rut. magister. Cran. hum. ungu. al-
cis C. C. pulv. antepil. varü Craton. Parentis mei dilect. p. m. &
 alia sexcenta quæ hic recensere nimis laboriosum tum ni-
 mistædiosum. Valdè etiam commendatur *Ἐπὶ ἐκείνῳ* illud
 de sangu. nigr. gallinæ, paroxysmum enim citò sedat, & reci-
 divam inhibet. Admirandam in sistendo paroxysmo vir-
 tutem tribuit *Weickardus in thes. pharm.* pinguedini catti sylv.
 si umbilico illinatur. Si verò paroxysmus est vehementior,
 neque remittit, aliquid de laudano opiato *Paracelsi* aut antepi-
 leptico *Hartman.* vel de oleo buxi exhiberi potest, quo sic spiri-
 tum fervor restringatur. Interim nec reliqua membra
 compatiencia negligenda: ob cordis sympathiam, appli-
 centur extra *epithemata, sacculi, balsama* cordis regioni & pul-
 sibus, intra vero specificis admisceantur cordialia: ubi à ven-
 triculo, addenda *ol. menth. Cinnam pæon. anisi &c.* Sic ubi
 ab utero primordium sumsit malum, apponendum empla-
 strum ex *galban. asafœtida, castor. &c.* internis autem admi-
 sceantur specifica uterina, qualis essent. *gran. ætes, & foetida.*
 Ubi à veneno sumpto vel immisso, alexipharmaca generalia
 & specialia adjungenda, habita tamen semper ratione æta-
 tis,

tis, sexus, temperamenti &c. Non inutilia sunt in ipso paroxysmo *amuleta*, qualia sunt *rad. & sem. pæon. d. t. coll. ungul. alc. corall. smaragdus, jaspis* &c. collo appensa.

PROPHYLACTICA CURA ipsam mineram, radicem & causam antecedentem respicit, & prohibet, ne iterum paroxysmus generetur. Perficitur hoc si humores vitiosi corrigantur, evacuentur, revellantur, eorū generatio impediatur, partium mittentium & suscipientium prava *Διάθεσις* & imbecillitas emendetur, & *μίσμα* epilepticum discutiatur. Materia harum indicationum ex triplici fonte sumitur, Chirurgico, pharmaceutico & diætetico.

CHIRURGIA. Primò occurrit venæsectio, quæ præser-
vationis gratia commodè institui potest, præsertim vere *Gal. de cur. rat. per sang. miss. 7.* cui etiam consentit *Paracels. tom. 4. l. 1. de caduco §. 4. tom. 5. fragment. l. 3. paragraph. de caduc. mo-*
dò sanguis etiam in vitio sit; variat, autem, prout fons mali in hoc vel illo membro hæret. Si jecur fomitem subministrat, instituatur in dextro brachio, ex liene verò si proficiscatur, in sinistro; commodius hæmorrhoides aperirentur, verum ne fistula inde oriatur, summè studendum. Nonnunquam caput *ἰδιοναρκωδς* afficitur, ubi venæ sublinguales turgidæ apparent, & tunc soluta prius plethora universi, capiteque roborato, cephalicæ etiam cum frontis & lingvæ venis aperiantur. *Aræus* in hac etiam ad arteriotomiam pervenit. Ubi malum stabulatur in utero, malleolorum venæ tundantur; quanquam in viris etiam saphanæ sectionem valdè comendat *Rasis in mirab. auscult. & Zac. Lus. l. 1. hist. 28.* sic enim ad maximè distantes partes fit diversio, quam etiam ipsa natura in hæmorrhoidibus insanix supervenientibus mōstrat *6. aph. 21.* Imò in epilepsia uterina, si à sanguine retento, etiam si mulier sit gravida, tutò posse celebrari hanc phlebotomiā, contendit & elegantissimis observationibus probat *id. l. d. hist. 32.* cui etiam assentitur *Moxius l. 2. m. m. morb. mul. per sangv. miss. c. 20.* Venæsectionis vicariæ sunt CUCURBITULÆ scarificatæ, sive partibus superioribus, sive inferioribus adhi-

bitæ, pro ratione fontis mali & plethoræ; non exiguum emolumentum promittunt, ubi malum in extremo hæret, aut per morsum animalis est immisum, si cum profundiore scarificatione, adaptentur, modò partis conditio id non prohibeat, aut ulcuscula diu aperta servantur. Non scarificatæ revellunt etiam & discutunt flatus, hinc modò occipitio, modò scapulis, nunc hypochondriis, nunc inguinibus adhibentur. Commodam evacuationem etiam præstant HIRUDINES locis convenientibus applicatæ, universalioribus præmissis. FRICTIONES partium extremarum, non supervacaneæ, *occipitis etiam commendat Heurn. de cap. morb.* ut & vincula dolorifica extremis injecta; potenter enim à parte affecta revellunt; imo paroxysmum jam jam instantem chorda quasi elisa suffocant. Dropaces etiam laudat *Cælius*. VESICANTIA cōmodè etiam in usum trahuntur, & in essentiali, & in sympathica. In essentiali, derafis prius capillis toti capiti possunt applicari, vel etiam regioni post aures, relictis diutius ulcusculis; sic enim *Hip. sententiæ l. de morb. sacr.* satisfit, quam operationem in contumacissimis etiam capitis morbis efficacissimam vidit *Septal. l. 6. animadvers. 55*. In sympathica verò ulcuscula, per vesicantia in parte affecta excitata, materiam futuro paroxysmo subtrahunt, virusque epilepticum illic latens, evocant. Talia sunt *flammula Jovis, taffia, sinapi, lepidium &c. Trallian. l. 1. c. 15*. Quod etiam perficiunt CAUTERIA debite instituta & fonticuli inde excitati, sive sint actualia, sive potentialia; sunt enim materia auxilii sensibilibiter evacuantis, indicanturq; à causa epilepticam causante & fovente. Unde Itali, præsertim *Florentini*, recēs natos cauterii ad motionem quasi salutare solent, ut ab epilepticiis convulsionibus præservent. In idiopathica supra suturam coronalem, seu circa concursum sagittalis & coronalis, excitentur, nec tantum periculum inde expectandum, modò cautè administrantur, nec altius imprimantur; tutius tamen nuchæ & occipiti inuri possunt; Imò in ipso etiam paroxysmo cauteria actualia laudat *Ranchin. tr. de morb. puer.*

puer. f. 2. c. 2. plurimum præstat Setaceum, validè enim eva-
 cuat à capite: exempla curationum annotavit *Gvil. Fabric.*
 In essentiali multi commendant apertionem cranii per tre-
 panum, *Paracels. tom. 5. fragm. l. 3. paragr. de caduc. t. 3. l. 3.*
paragr. c. 4. quo sic fuligines exhalent. Si verò aliundè ma-
 teria transmittatur, ratione partium vel supra vel infra renes
 positarum, vel in brachiis vel in femoris interna & tibiæ
 sylvestri parte excitentur, servata semper rectitudine partiū.
 De harū ustionum insigni utilitate pluribus agit *Zac. Luf. l. 1.*
bist. 20. Cautio tamen sit, ne ulla fiat ustio aut sectio, nisi post
 plurimas repetitas purgationes, modò non urgeat morbi ve-
 hementia Sic ubi cranii pars est corrupta, aut alibi os cario-
 sum epilepsiam fovet, eximendum aut ustione sanandum.

PHARMACIAM materiam peccantem præparat, univer-
 saliter & particulariter evacuat, miasma epilepticum absu-
 mit, membrorum pravam diathesin corrigit, illaque roborat.
 Sed antequam hæc in usum vocentur, alvus primum sollici-
 tanda, ut à primis viis feces, ipsisque permixta colluvies edu-
 catur, quod fieri potest *glandibus, clysteribus, aut levibus ecco-*
proticis, quibus stimuli loco *purgantia* in minore dosi possunt
 adjici v. g.

Si adjuncta sit cacochymia PHLEGMATICA.

<i>Rx</i> elect. ben. lax. ʒss.	<i>Rx</i> rad. ireos
fecul. pœon.	pœon. an. ʒi.
bryon. an. gr. vj.	fol. rutæ p. j.
Crem ♀ ʒss.	polii
agaric. rec. trochisc. ʒj	fl. lil. convall.
extr. major. griij	tiliæ à pii
sacchar. q. s. M. F. bolus.	agaric. crud. albif. ʒj
<i>Rx</i> ♀ Olat. ʒj	Coq. om. in f. q. aq. fl. til.
fecul. aron. gr. vij	Col. ʒiiij adde
agaric. trochisc. ʒj	Mann. Calabr. ʒj
sacchar. Cinnam. gr. iij. M.	syr. diacarth. ʒl.
F. pulvis.	Ol. fœnic. gij M. F. Potio.

BILIOSA si adsit

<i>Rx</i> essent. aloës gr. xvj	<i>Rx</i> pulv. laxat. veget. gr. xv
	D 3 extr.

extr. rhabarb. gr. x
 rel. scam. gr. iij
 magist. Cran. hum. gr. vj
 M. F. l. a. Pil. xvij
 R̄ tinct. rhabarb. sangv.
 fol. sen. ā ʒj
 syr. viol. sol. ʒj
 sp. ʒl. vir. giiij. M. F. Haustus.

Crystill. ♀ scammon. g. x
 Ol. major. g. j M. F. Pulv.
 R̄ cass. fistul. ʒvj
 pulv. rhabarb. el. ʒf
 Cryst. ♀ gr. x
 ol. anthos. gj
 sacch. par.
 F. l. a. bolus.

In MELANCHOLICA hæc convenirent.

R̄ elect. diacathol. ʒvj
 extr. fol. sen. ʒf
 syr. de polypod. ʒf
 aq. Ceras. nigr. ʒif M.
 F Potiuncula
 R̄. mass. pilul. ♀ rear. ʒj.
 extr. rad. pœon. gr. vj.
 ol. succin. gj. M.
 F. pil. xvij.

R̄ fol. sen. f. f. ʒij
 passul. mund. & lot. ʒiij
 fol. beton.
 rorimar. ā mf
 fl. tilia p j
 gran. pœon. ʒif.
 Contunde om. in pulp. injice
 in vas fictile, & affunde aq.
 cal. ʒxxx.

R̄. pulp. prun. damasc. ʒj.
 Crem. ♀ ʒf.
 extr. fol. sen. ʒf.
 helleb. nigr. gr. vj.
 sacchar. alb. par. M. F. bolus.

M. & statim contege, pone in
 locum calidum per noctem,
 postea cola & per subsiden-
 tiam claresce. dos. ʒf. ad ʒv
 vel vj.

Verum si MISTII essent humores, tale conveniret

R̄. extr. de 4. reb.
 Crystill. ♀ an. ʒj.
 Mann. Calabr. ʒf.

dissolv. in juscule carnis q. f.
 adde sacchar. Cinnam. gr. iij.
 M. F. potiuncula.

Et si in ventriculo saburra vitiosorum humorum stabulatur,
 commodè VOMITORIA exhibentur. Lene est ex jure gal-
 line pingvi cum ol. amygd. d. vel suc. raphan. & oxymel. Vali-
 dius operatur diasar. Fernel. coagul. asar. manna vomit. Querc.
 aq. ben. Rulandi, syr. vomitorius Hartm. vomitorium Plateri,
 Conrad.

Hinc ad vitiosos humores PRÆPARANTIA acceden-
 dum, quæ pro humoris & partium affectarum diversitate
 varianda sunt.

In cacochymia PITUITOSA utiles sunt syr. de beton. s.
*& comp. pæon. hyssop. stœchad. fl. lil. convall. absynth. prim. ver.
 meliss. eupator. oxym. s. scyll. essent. beton. cal. arom. prim. ver.
 menth. organ. &c. cum aq. appropri.*

Rx. aq. hirund. ʒvj.	facch. Cinnam. gr. iiij. M.
lil. convall. ʒj.	detur in charta pro 2 dosib9
essent. rad. pæon. ʒs.	Rx. conserv. fl. pæon.
cal. arom. gr. vj.	lil. convall.
syr. stœch. arab. ʒs.	tiliæ an. ʒj.
oxymel, scyll. ʒiij.	rad. eryng. cond. ʒs.
tinct. . . ʒg. vj.	essent. beton. ʒs.
facchar. rut. gr. iiij.	extr. zedoar. ʒs.
M. F. Haustus.	pulv. rad. pæon. ʒj.
Rx. fecul. pæon.	ol. majoran. g. iiij.
ari	sp. Oli comp. g. viii.
scyll.	syr. de stœchad. qf. M.
magist. ʒ ʒris an ʒs.	F. l. a. Opiat. dos. magn.
⊖ cal. arom. gr. ij.	castan.
beton. gr. iiij.	

BILEM præparant cephalica frigida, quibus admiscen. syr.
*acetos. s. & comp. de cichor. nymph. fragor. ceras. acid. granat. ber-
 ber. prædictorum essentia, tinctura &c.*

Rx. essent. acetosel.	ol. Citr. g. ij. M.
fragor.	pro 3 dosibus.
plantag. an. ʒj.	Rx. visc. q. ʒij.
aq. nymph.	Ceras. nigr. n. xv.
dentar. an. ʒij	berber. p. i.
syr. corall. ʒj.	fl. violar.
tunic. ʒs.	nymph.
tinct. corall. ʒj M.	til. an. p. i.
dos. coch. j. vel ij.	Coq. om. in s. q. aq. s.
Rx. magist. corall. ʒs.	Col. ʒ iiij. adde
perlar. ʒj.	syr. de cichor. ʒvj.
fuccin. præp. ʒs.	violar. ʒs.
Crystal. ʒ ʒj.	sp. Oli g. vj.
	M. F. Potiuncula.

MELANCHOLIAM præparant syr. de borrag. bugloss.
fumar. capill. ♀ ceterach, epithym. de pom. essentie etiam prædi-
ctor. &c.

Rx. syr. fl. tunic.

borrag. an. ℥i.

aq. carfunc. ℥ij.

sp. ☿ compos. ℥j.

sol. corall. ℥j.

essent. borrag. ℥ij

fraxin.

fumar. an. ℥f.

aq. pomor. redol. ℥iij.

M. pro duabus dosibus.

Rx. conf. borrag.

bugloss. an. ℥ij.

Confect. alchem. ℥j.

essent lupul. ℥f.

fecul. pœon. gr. vj.

sacchar. citr. g. iij.

albis. par. M.

F. bolus.

Rx. spec. elect. de gem.

diamosch. d. a. ℥f.

Cran. hum. præp. ℥j.

extr. meliss. gr. viij.

lign. aloës g. vj.

sacchar. albis. aq. borrag.

sol. ℥iij.

F. l. a. rotulæ, & illinantur

ol. citr.

Humorum præparationem excipit PURGATIO, quæ
prius sit lenior, postea fortior; instituatür autem per epicra-
sin, intermistis sc. præparantibus & corroborantibus; pluri-
mum conducit, si hæc cura per totum annum continuetur,
primo singulis ternis vel quaternis diebus purgando, postea
unaquaque septimana, hinc mense, tandem vere & autumnò:
sic enim morbus futurus præcaveretur; prout autem humor
abundat, ita purgantia dirigenda sunt.

In PITUITOSA conveniunt *agaricus* s. *trochisc. mec-*
choac. gialap. hermodact. turbith. colocynth.

Rx extr. pilul. cochiar.

colocynth. an. ℥f

cephalic. gr. v

fecul. bryon. g. iv

Ol. Cinnam. gi

syr. diacarth. q. f.

F. Pilul. num. xvij.

Rx elect. diacarth. ℥ij

spec. diaturbith. ℥j

succin, alb. ppt. gr. vj

Ol. anth. gi

sacch. alb. par. M.

F. bolus.

Rx agaric. trochisc.

mecchoac. alb. an. ℥j

trochis. alhand. gr. iij

☿ ☉ lat. ℥f.

Ol. succin. gj M. F. Pulv.

Rx.

R^x. rad. pœon. ʒij.

eryng.

fcyll. ppt. an. ʒj.

polii mont. p. j.

agaric. alb. lev. ʒij.

mecchoac. alb.

sem. cnic. ponder. an. ʒj.

turbith. elect. ʒij.

In caufa BILIOSA conducit *rhabarb. myrobal. citr. cort.*

frang. scammon. &c.

R^x. extract. cholagog. Q. ʒj.

pilul. aur. ʒf.

res. scammon. gr. iiij

magist. D. gr. iij

Ol. cirt. gj

syr. de cichor. c. rhab. q. l.

F. Pil. xxiv.

R^x cathart. ros. ʒiiij

fecul. pœon. gvi

Crem. ♀ ʒf

facch. par. F. Bolus,

R^x ♀ ⊕ lat.

extr. scammon. an. ʒf

magist. ung. alc. gr. vj

ol. anisi gj

M. F. pulv.

In MELANCHOLIA profunt *epithymum. sena. polypo-*
dium. helleb. nig.

R^x. pil. ♀ rear. c. ammon. ʒj

extr. helleb. nigr. gr. ix.

cephal. gr. v.

trochis. alhand. gr. iiij.

⊖ pœon. gr. iiij

ol. salu. g. j.

syr. fl. til. q. f.

M. F. Pil. n. xxv.

fl. anth.

prim. ver. an. pj.

ZZ alb. gr. x

spic. gr. ix

Coq. om. in f. q. aq. beton.

Col. ʒiiij adde

elect. de tamarind. ʒif.

1yr. diacarth. ʒf. M. F. Potio.

R^x visc. q. ʒj

sem. pœon. ʒf.

fl. stœchad. arab. pij

tiliæ

pœon. an. pi

myrobal. citr ʒiiij

rhabarb. opt ʒij

fl. prun. sylv. ʒif.

sem. anisi ʒf.

Coq. om. in f. q. aq. f.

Col. ʒiiij. adde

syr. violar. fol.

diafer. an. ʒf.

elect. ros. Mes. ʒj.

facchar. Cinnam. g. iii.

M. F. Potio.

R^x. pulp. tamarind. ʒiiij.

pulv. fol. sen. ʒj.

Crytall. ♀ ʒj.

extr. helleb. nigr. ʒf.

magist. C. C. gr. vj

facch. alb. par. F. bolus.

R^x. pulv. sen. Montag. ʒij.

♀ ⊕ lat. gr. x.

ol. fœnic. g. ij. M. F. Pulvis.

E

R^x.

℞. spec. fen. Gereon. ʒiij.
 fol. fen.
 follic. fen. an. ʒij.
 fibr. helleb. nigr. ʒj
 fl. borrag.
 bugloss.
 tilia an. p. j.

Infunde om. in f. q. aq. prim. ver.
 stent per noctem, mane lev.
 ebulliant
 Col. express. ʒiij adde
 elect. diasen. ʒiij
 syr. pomor. Sabor. ʒss.
 aq. Cinnam. ʒis.
 M. F. Potio.

Ubi humores SEROSI sunt conjuncti, conferunt *rad.*
irid. nostr. asari. gialap. esul. gratiol. coccogn. gum. de peru &c.

℞. ref. gialap. gr. xvj.
 magist. gum. gut. gr. iv.
 extr. cort. esul. gr. viij.
 ♂ succin. vol. gr. iij.
 ol. foenic. g. ij.
 syr. diaser. q. f.
 F. l. a. pil. n. xxi

℞. elect. ben. lax. ʒss.
 fecul. irid. nostr. ʒss.
 ♀ dulc. gr. vj.
 ol. succin. g. ij.
 sacchar. par. F. bolus.
 ℞. Cran. hum. ppt. gr. viij.
 hermodact. ʒj.
 ref. gialap. gr. x.
 sacch. Cinn. g. iij. M. F. pulv.

Et si humores sunt MISTI, etiam mixtæ facultatis me-
 dicamenta sunt præscribenda, qualia sunt *syr. helleb. Q. oxy-*
mel. helleb. Julian. in forma enim syr. magistralis optimè
 conveniunt, e. gr. si cacochymia in inferiore ventre resideat.

℞. rad. cichor.
 gramin.
 polypod.
 pœon. an. ʒij.
 scyll.
 bryon. an. ʒi.
 visc. q. ʒiij.
 Cort. cappar. ʒil.
 sem. pœon. d. t. coll. ʒii.
 Cass. lign. ʒis.
 fol. hyssop.
 pol. mon.
 cuscut.

ceterach. an. mj.
 fl. tilia
 lil. conval. a. p. ij
 tamarind. integr. ʒvj.
 Crystall. ♀ ʒj.
 gialap. ref. ʒj.
 helleb. nigr. ʒij.
 Incid. incidantur & cont. con-
 tundantur M. & coquan-
 tur in aq. font. lb iij ad par-
 tis tertiæ consumptionem
 Colaturam funde super
 fol. fen. s. s. ʒiij

rha-

rhabarb. opt.
 agaric. albiss. an. ℥i
 & macera per noctem, mane,
 semel tantum ebullire finito,
 & postea percola cum aliquali
 expressione
 Colat. adde
 mannæ calabr. ℥ii
 Crystal. ♀ ℥i

M. & dissolve iterumque cola
 & leniter exhalare finito ad
 ℥viii
 tandem admisce
 syr. de cichor. c. rhab. ℥iiii
 diafer. ℥i
 F. syr. qui aromatiz. c.
 sacch. Cinnam. gr. vi.
 Citr. gr. iv.
 dos. ℥i ad ℥is.

Ad hunc modum concinnari poterunt varia remedia,
 quæ tamen non indiscriminatim cuilibet offerenda; nam
 puero lactanti ejusmodi minus conveniunt, igitur nutrici
 potius exhibenda: aut sint leniora, quale est *syr. de cichor. c.*
rhab. cujus unico usu multi infantes præservarunt. *Hermeti-*
ci pro purgatione epilepticorum plerumque eligunt ♀ *d.* ♀
vite correct. *mannam* ♀, *specif. purgans Paracelsi.*

Alterantia & purgantia excipiunt DIAPHORETICA,
 quæ unâ sint specifica, ut sic obstructions expediantur, hu-
 mores vitiosi quoquo modo præparati exhauriantur, mali-
 gni vapores excludantur, & membrorum œconomia depra-
 vata in integrum restituatur. Horum autem usus per plures
 dies continuandus. Inter simplicia commendantur *rad. chin.*
scorzon. sarsaparil. pentaphyll. pæon. dictamn. vincetox. tor-
ment. fol. rut. lign. guajac. sassafir. quern. bux. visc. q. CC. &c.
 Composita sunt *aq. theriac. comp. cephal. typhor. C. sp. lign.*
guajac. visc. q. lign. rhod. sars. paril. card. ben. sambuc. lil. con-
vall. CC. cran. hum. sang. hum. ♀, mist. s. & comp. tinct. & dia-
phor. gelatina C. C. extracta prædictorum simpl. & item guajaci
vinctox. pæon. sars. paril. volat. C. C. & diaphor. bezoart. min.
s. & re, & re, ♀ aurat. diaphor. &c. ex quibus varia decocta,
 aquæ, misturæ, pulveres &c. concinnari poterunt.

Inter plurima tamen præstat decoctum *ligni guajaci* ad
 longius tempus usurpatum; nam incidendo, attenuando
 causam antecedentem resolvit, detergendo evacuat, & sudo-
 res movendo massam sanguineam defecatam reddit non si-

ne corroboracione viscerum, propter amicam astrictoriam.
facultatem sibi conjunctam.

R^x lign. guajac. ℥iij
buxi

visc. q. an. ℥iss

rad. pœon.

tormentil. an. ℥vj

ras. CC.

Cran. hum. an. ℥iij

fem. pœon.

card. ben. an. ℥ij

Infundantur om. in aq. f. ℥vj, addi.

stent in digestionem per horas, R^x. bezoard, min. Dris ℥ss.

xxiv hinc coq. in vase clauso

ad unius tertie cōsumptionem

sub finem addendo fl. tiliæ

lil. convall. an. pii R^x. magist. perlar. gr. v.

ponantur in loc. frig.

Col, adde

syr. fl. pœon.

lil. convall. an. ℥iss M.

dof. ℥vj mane, sudet per hor. R^x. aq. theriac, cephal. ℥i

dimid. in laconico.

R^x reliq. decoct.

adde rad. sars. paril. ℥j

passul. min. ℥jss

aq. fontan. ℥xvj

Coq. ad ℥x

sub finem adde

Cinnam. elect. ℥ss

Coriandr. ppt. ℥iss. F.

decoctum pro communi potu.

Ex fecibus relictis & igne re-

verberii calcinatis, aq. card.

ben. sal extrahi & purificatus

per crebras solutiones & coa-

gulationes primo decocto ad

majorem efficaciam potest

Cinnabr. ℥ gr. vi

⊖ C.C. vol. gr. iv M.

F. pulvis.

R^x. magist. perlar. gr. v.

Cran. hum. gr. vi

⊕ aurat. diaph. ℥ss.

rob. sambuc. ℥ij

facch. par. F. bolus.

R^x. aq. theriac, cephal. ℥i

mist. f.

sp. C.C. an. ℥i

lil. convall. ℥iss.

tinct. ♂ diaphor. ℥i

facch. succin. gr. viii.

M. dividatur in tres do-

ses.

Eundem usum etiam præstant DIURETICA, reliquias
enim humorum vitiosorum per urinas expellunt. Talia
sunt præter multa diaphoreticorum *rad. fœnicul.* cum aliis
aperientibus, *beton. chærefol. spica, schœnanth.* Inter compo-
sita sunt *spir. ♂ marini, ♀ satus, tinct. ♀, arcan. ♀ sp. bacc.*
sambuc, ebul. essent. sambuc. frag. petrosel. fecula petrosel. ♂ suc-

cini fixum & volatile, pimpinel. genist. junip. magist. ocul. 69. ex quibus variæ possunt fieri compositiones.

℞. fercul. petrosf. gr. x.	aq. petrosel. ℥iſ.
magist. ocul. 69. gr. vi.	M. F. potiūcula pro 2 dosib.
⊖ succin. vol. gr. iij. M.	℞. rob. veron. ℥ii
F. pulvis.	essent. fragor.
℞ tinct. ♀ ℥i	petrosel. an. ℥i
spir. bacc. samb.	magist. succin. ℥ſ
ebuli an. ℥i	sp. ⊖ mar. g. iij
essent. chærefol. ℥ſ.	sacchar. par.
sacchar. foenic. gr. iv.	F. bolus.

In eorum autem administratione diligenter advertendum, ne eorum crebriore usu sanguis in prægnantibus concitetur, menses aperiantur, & uteri expultrix moveatur, abortus enim periculum incurrerent.

Magnum etiam levamē sentiunt ægri ex ACIDULARUM usu, præsertim si sit sympathica, nec inveterata; obstructions enim aperiunt, mineram resolvunt & educunt, & per sp. ⊖ li volatilem, quo scatent, peculiari facultate epilepsiæ contrariantur. THERMÆ etiam in essentiali conferunt.

UNIVERSALI evacuatione præmissa, particulares rite succedunt. Hæ autem præcipuè respiciant partem mandantem seu locum causæ antecedentis. Si igitur caput per-
essentiam afficitur, expeditur per *errhina, sternutatoria, apoplegmatismos, gargarismos, masticatoria*. Si ventriculus est in causa, juvat *vomit*, præsertim si à chylo corrupto. Si hepar aut lien, eorum *obstructions* & feces tollantur. Ubi ab intestinis, vermibus sc. ibidem hærentibus, malum originem sumit, repurgantur per purgantia *helmintica* ex ♀ præcipuè desumpta aut ♂, qualis etiam *aq. ex magnesia saturn. & crusta panis Querc.* Uterus verò depuratur per leniora *pharmaca, uterina* sæpius repetita, & *menses moventia*. Sic vesica per-
diuretica. Extrema commodè liberantur per *vesicatoria, cauteria, fonticulos*, de quibus antea in chirurgia. Semper autem hic specifica antepileptica addenda. Formulæ videantur passim apud practicos.

Corpore sic evacuato, SPECIFICA & APPROPRIA-
 TA in usum trahenda; in his enim maxima curationis spes si-
 ta; hæc tamen supradictis etiam addi aut intermediis die-
 bus exhiberi possunt. Præcipua sunt rad. pæon. d. t. coll. py-
 reth. eryng bryon. valer. sylv. dentar. scyll. vincetox. palm. Christ.
 acori, artemisia in carbonem versa, ruta hortens. sylv. polium
 montanum, verben. septinervia pentaphyl. millefol. fl. pæon. tilia
 lil. convall. anagall. rubr. sem. pæon. palm. Christ. visc. q. coryl.
 tilia, succin. ossa hum. Cran. hum. secundina ppt. unicornu, un-
 gula alcis, castor. turtur fœmina, hirundo tota aut lapides in juni-
 oribus inventi, talus suillus, vesica apri cum urina in furno ex-
 siccata C. C. coagulum lepor. massa vomitu rejecta à pullo equino,
 hepar asini, turdi, ursi, ran. virid. caro mustelæ, cor lupi, leporis,
 hirundinis, Cicon. vultur. Cervi, perdic. testiculi apri, ursi, arie-
 tis, galli, asini, lac equinum, asininum fœcus pavon. secundina,
 lac, cerebrum asin. fel catuli Coral. rub. crystal selenit. jaspis,
 smaragd. chelidon. Cinnabr. nat. & aq. dentar. ceras nigr. lil. con-
 vall. calendul. ruta pentaphyll. tilia pæon. alsin. millefol. sylv. picar.
 hirund fec. hum. Matthiol. ex minera saturn. crusta panis Querc.
 epileptica Langj. Hartm. Querc sp. Oli vol. vis. q. coryl. buxi, C. C.
 Cran. hum. epilept. puer. Hartm. sangv hum. Paracels. solutio tinct.
 corall. & , arcanū Oli, essentia mumia, sang. hum. quam propriū
 alexipharmacū Cl. Deodatus nūcupat, cran. hum. salviata, ol. suc-
 cin. cran. hum. ligni heracl. pæon. castor. ungu. alcis, elixir pæon.
 Mynsicht. confect. antepilept. Paracels. liquor D. virid. syr. de ni-
 cotiana (cujus singulari usu plurimos epilepticos ab aliis reli-
 ctos se sanasse gloriatur Zacus, Lusl. i. hist. 29) extract. cran. hum.
 C. C. lign. bux. fl. tilia, pæon. antepilept. Cl. Deodati, magist. corall.
 succin. C. C. Cran. hum. J, pulveres varii Marchion. Kolreut.
 Hartm. & c. Ex his variæ formulæ effingi poterunt, e. g.

Rx. miner. Cris

C. C. Oli. lat. an. 3j

magist. cran. hum.

ungul. alc.

fecul. pæon. an. ʒi

smaragd. ppt. gr. xvi.

⊖ succin. vol. gr. viii. M.

F. pulv.

Rx. extr. pæon. gr. xv

Cran. hum. ʒi.

castor. gr. iiii

magist. Lunar. gr. vi

Cin-

Cinnabr. antimon. ℥ss

fyr. de nicot. q. s.

F. pilul. min. pro 2 dos.

℞. pulv. marchion. ℥i

succin. ppt. ℥ss

Cran. hum. ppt.

raf. ung. alcis an. ℥i.

extr. rad. dictamn.

visc. q. an. gr. x.

facch. alb. in aq. Gal. sol. ℥iv

Coq. ad deb. consist.

sub finem adde

Ol. rutæ

succin. an. g. iij

Cubeb. g. iij

ambr. gryf. gr. ii

F. l. a. rotulæ, illinantur

ol. Cinnam.

℞. mist. ℥vi

sp. C. C. rectif.

Cran. hum. an. ℥ii

sangv. hum.

aq. aur. Lang.

sp. ceras. nigr.

fl. tilia an. ℥ss

lign. guajac. ℥ii

arcan. ungu. alc. ℥i

tinct. corall. ℥ss

lunæ ℥ii

Ol. camphor. g. viii.

facchar. succin. ℥ss

Interim membra affecta etiam ROBORANDA tum internis, tum externis; Ad CAPITIS corroborationem

℞. conf. fl. lil. convall. ℥vj

salv.

beton. an. ℥ss

Calam. arom. cond. ℥iij

tinct. pœon. ℥lat. ℥ss M.

S. Mistura antepileptica
composita.

℞. Cran. hum.

C. C. crud.

ungul. alc.

hirund. exsic. an. ℥j.

rad. pœon. d. t. col.

tormentil

visc. q. an. ℥ss

lign. guaiac. ℥ii

epat. ran. virid. num. xx.

sem. pœon. ℥ii

scyll. ppt. ℥ss

castor. ℥ss

camphor. gr. vi

Incid. incidantur & contun-

dantur & infundantur in

sp. lil. convall.

ceras. nigr. an. ℥ss

aq. fl. tilia

mercurial. an. ℥viii

sp. Oli philosoph. ℥i

Stent in leni balnei calore per

d. xiv hinc destill. feces resi-

duas calcina, & aq. dentar.

extrahe, per crebras solu-

tiones & coagulationes puri-

fica, & destillato adde & cir-

cula per mensem r.

S. Spiritus antepilepticus.

℞. rad. irid. fl.

cyper. an. ℥i

pœon. ℥ss

fl. lil. convall.

nuc.

nuc. mosch. in Ind. con. ʒij
 extr. ceph. major Querc. ʒi
 theriac. Androm. ʒj
 spec. diamb. r.
 pler. archont. an. ʒij
 ras. ebor.
 pulv. rad. pœon. an. ʒij
 Confect. de hyacinth. ʒj
 Ol. caryophyll. g. iiii
 sp. ʘ li philof. g. x
 fyr. fl. pœon. q. i
 M. F. l. a. Opiata

meliss.

ros. rubr. an. p. ii
 caryophyll. ʒi
 sem. pœon. nigr. ʒi
 lign. rhodii
 assafr. an. ʒii
 succin. alb.
 styr. calam. ʒi
 ambr. gryf. gr. ii
 Incid. & cõt. & F. cū synd. rubr.
 Cucupha.

Si VENTRICULUS laboret

Rx. spec. aromat. caryophyll. ʒi Rx. ol. nuc. molch. expres.
 diagalang. ʒj bals. de Peru. an. ʒi
 pulv. rad. pœon. Ol. mastich. ʒij
 Corall. ppt. ladan. pulveris. ʒj
 nuc. mosch. an. ʒi Ol. menth.
 Coriand. ppt. ʒj macis an. ʒij
 lign. aloës ʒi ros. g. iij
 sacchar. ros. tabul. ʒi M. extr. pœon. ʒi M.
 F. l. a. Tragea F. l. a. balsam. stomachal.

EPATIS si adsit imbecillitas

Rx. spec. diarrhod. abbat. Rx. spec. diatr. fantal.
 de gem. cal. an. ʒij diacurcum. an. ʒii
 extr. calam. arom. gr. viij Corall. rubr. ppt. ʒi
 Zedoar. g. vj schænanth. gr. viij
 pœon. gr. iij epat. lupin. ʒi
 Croc. ʘ aperit. ʒi camphor. gr. iij
 sacch. alb. aq. cich. sol. ʒiij aq. agrimon. ʒvj
 F. l. a. rot. quæ illin. vin. malvat. ʒii M.
 Ol. Cinnam. F. Epithem. hepaticum.

LIEN ubi est debilis

Rx. aq. scorbut. Q. ʒi Rx. ol. de cappar.
 fyr. fl. borrag. chamomil. an. ʒi
 gran. cherm. an. ʒi emplestr. splen. Sen. ʒii
 sp. nasturt. aq. ʒi spec. dialac. ʒi

Con-

Confect. alcherm. 3℥
extr. cort. fraxin ʒss. M.

F. haustus per 2 dosibus.

UTERUS ubi peccaverit.

R. spec. diamarg. cal. ʒii

secund. ppt. ʒi

fecul. bryon.

pœon. an. ʒss

magist. corall. gr. xvi

⊖ meliss. gr. viii

sacch. cinnam. g. vi

F. pulv. pro 3 dos.

Ol. absynth. dest. g. v.

Ceræ ʒss. M.

F. linimentum spleneticū.

R. gum. galban.

sagapen. †. sol. ʒii

ladan. ʒii

benzoin.

styrac. cal.

pulv. matricar. an. ʒi

ol. absynth. q. s.

F. l. a. Empl. matricale.

Externæ partes plerunque externa admittunt, qualia sunt olea, linimenta, ungenta, emplastra, fœtus &c. In hac a. remedi-
diorū varietate non promiscuè quæ offeruntur, in usum tra-
henda sunt, sed delectus instituendus est; nam prudētis & cu-
rantis est medici, inquit *Galen. in cons. pro puer. epil.* medica-
mentorū quantitātē, qualitātē, modū & occasiones moderari
secundū necessitatis indicationes; non enim eodem semper
modo præscribenda, nec omni loco aut tempore exhibenda:
hæc n. tradita cura generalis est, quæ in particulari variat se-
cundū morbi speciē, locū, causas, temperamentū, ætatē, sexū,
anni tempus. Id quod etiam observat *Paracels. t. 4. l. 1. de cad.*
S. 4. Sic longè aliter tractandus infans quam adolescens, vir,
adultus; Pauca enim pueris sufficiunt, cum utpl. ætatis ratio-
ne curentur 2. *aph. 45.* Præservantur tamen ab hoc morbo in-
utero existentes, si prægnanti à quarto mense ad tempus par-
tus sæpius detur aliquid *aq. vitæ mul.* aut *bals. embryon.* cum
guttis quibusdam *ss. antepileptici*, aut *pulv. spinæ mustelæ vivæ*
detractæ cum *magist. perlar. corall.* Recens v. natis, antequam
lac sugant, aut cibum capiant, detur *mist. ex ol. amygd. d. &*
sacch. hinc etiam pulvis ex *sterc. vaccæ nigr. calcinato ʒss. vel ʒi*
pro excrementorum educatione. Balnea pestea fiant ex deco-
cto *cort. salie, rec. Hartm. præct. chym. Stocker. pr. med. p. 16.* val-
dè commendat *syr. de cichor. c. rhab.* propria urina mixtum;
hinc etiam *Cl. Sennertus l. 1. pr. p. 2. c. 31. folia ulmi cum urina*
propria cocta tanquā cataplasma ventriculo applicat. Utilis

F

etiam

etiam est *syr. fl. pæon. sp. Oli acidulatus. fl. tilia, muls. sem. pæon. sp. antepilepticus puer Hartm.* In reliquis cura præcipuè dirigatur ad nutricem. Sic ubiq; medici dexteritas requiritur, modo conscientia & famæ integritas ipsi sit proposita.

Non exiguum etiam fructum promittunt AMULETA: *pæonia* ipsius *Gal. 6. simpl.* autoritate celebris: in puero enim epileptico sui experimentū fecit. *Æqualē, nī dicā majorē, virtutē tribuit Hartm.* periapto ex virgultis *sambuci super salicem crescentis*: utrumque autem debito tempore sit collectū; Modū administrādi tradit in *praxi chimiātr. p. 39. Viscus q.* etiam utilis. *Ungula alcis* miros effectus præstat, duo exempla recēset *Lemnius l. 2. de occult. nat. mir. c. 3.* Eosdē successus pollicetur etiā *ungul. asin. & c.* Sic *corall. rub. smaragd. jaspis & chelidon.* è collo penduli reluctantur morbo. Quā v. vi id præstēt, obfcurum: puto tamē per effluviū aliquod spirituale cōtingere.

DIÆTA. Rerum non naturalium conveniens ratio instituat, nā & hæc sola epilepsiæ curationē afferre potest *2. ap. h. 45* multosq; unica hac diæta absq; remediis se curasse scribit *Gal. l. de atten. vict.*

AER sit lucidus & purus, calidus & siccus magis & minus, pro ratione temperamēti ægroti. si non natura, arte talis evadat. Vitetur tenebricosus, nubilosus, foetidus, fuliginibus & fumis noxiis ex *gagate, bitumine, C. C.* & aliis quæ peculiariter epilepsiam manifestare solent, repletus, venti austrini, aquilonares, radii lunares. Juvat mutatio de loco in locum, de regione in regionem *2. ap. h. 45.*

CIBUS & POTUS sit moderatus: nec enim satietas nec inedia, si modum exceßerint, bona. *2. ap. h. 4.* prandium cœna sit liberalius. Cibus sit *εὐπεπτός, εὐχρυστός*, flatuum expers, non varius, nec admodum jurulentus, potius assus: præparetur *hyssopo, thym. puleg. serpil. salv. majoran. Cinnam. garyoph.* ast salsa, acria, vaporosa & nidorulenta condimenta seponantur, qualia sunt cepæ, allium, porrum, eruca, raphan. sinap. Conveniunt carnes pull. gallinac. capon. pipon. perdic. attagen. phasian. turdor. turturum, avium mont. vervecin. vitulina, lepuscul. seponantur contra carnes anser. anat. & reliquarum avium palust. cervina, suilla, caprina, sali-

lita, infumata. Piscium usus sit rarus & eorum tantum, qui in
fluviiis rapidioribus degunt, & sunt saxatiles & squamosi. Cō-
tra paludosi penitus fugiēdi, quales sunt carpiones, anguillæ.
Lac & lacticinia non admodum utilia: ova tremula confer-
runt. Panis sit optimè fermētatus & salitus. Inter fructus com-
mendantur cappares, uva passa, pistacia. Juvat in principio
mensæ rutam viridem sumere, in fine v. panem biscoctū, tra-
geam stomachicam & antepilepticam. Potus sit parcior, præ-
sertim vini, quod planè nō concedendū, nisi sit oligophoron,
medicatū, vires imbecilles, ægerq; assuetus, talia n. minus no-
cent 2. *aph.* 50. taliq; consuetudini aliquid concedere jubet
Hip. 1. aph. 17. Nihil verò magis nocet epilepticis quam merū
Jan. Damasc. l. 3. c. 23. cum partiū nervosarum principiū labo-
ret *Gal. 3. de temp.* 2. ad quos humores crudos, defert *Avicen. 2.*
tertij c. 4. Præstat cerevisia benè defecata, non crassa aut vapo-
rosa, hydromel medicatum. Ethic victus rursus pro ætatis,
tēperamenti, loci affecti, causæ morbificæ & c. ratione variādū.

SOMNUS & VIGILIAE sint moderatiores: utraq; n. si
modū excedant malū 2. *aph.* 3. vitetur maximè diurnus & mox
â cibo initus ob κατὰ νύκτα metum: instituat capite non
nihil elevato.

EXERCITIA non omittantur: salutis n. humanæ qf.
basis & fundamentū sunt *Hip. 6. Epid. s. 4. t. 22.* & homo edens
sanus esse non potest, nisi laboret *l. 1. de diet. num. 1.* undè et-
iam corpora multo fiunt vegetiora *l. 3. de artic. t. 32.* Sint
moderata, & justo tempore instituantur, præsertim vacuo vē-
triculo. Juvant frictiones à superioribus ad inferiores partes
descendendo: caput singulo manè diligenter detergatur.
Balnea corpore impuro & repleto nocent, inferiorum tamen
partium lotiones ex cephalicis & specificis utiles, quanquā
capitis etiā pro roboratione valdè laudet *Crato in consil. Schol.*

ALVUS sit semper aperta: si non natura, arte talis evadat.

VENUS in idiopathica valde nocet; nam συνσχία ἐστὶ συμ-
παθητικὴ ἀπὸ τῆς μήτρας: in sympathica v. ex utero & semine retento
moderata confert, modo licita: nutricibus penitus interdi-
cendā; lac n. odoris gratia in deterius mutatur, tenuius effici-
tur, menses citantur, utero concipiunt, unde lac imminuitur,
corrumpitur *Jan. Damasc. l. 3. c. 23.*

Ab

Ab ANIMI perturbationibus liber sit æger, præsertim ira, tristitia, terrore & aliis quæ superius in causis remotis dicta sunt: studia à pastu nocent, & cogitationes à pastu tutæ non sunt.

COROLLARIA.

1. Ut Arteriarum, sic etiam venarum principium est cor.
2. Affectus modi substantiæ diversi sunt ab affectibus occultarum qualitatuum.
3. Non omnia vulnera cerebri, etiam particula ejus abscissa, ex necessitate lethalia.
4. Sanguinis humani adhuc calentis potus & truculentus & parum ad epilepsiæ curationem proficiuus.
5. Medicamenta præparare à medici dignitate non alienum.
6. Ex talco oleum Cosmeticum educi posse, svadet ratio & experientia.

MACASIO ZWICCAWIENSIIUM MEDICO Felicissimo Salutem.

Semina quæ deceat morbi exstirpare caduci,
seminecesq; Orci faucibus eripere,
dum Tu, Pæonij MACASI gloria cætus
disseris, aggredieris grande laboris onus.
Hinc flos immarcescibilis TIBI surget Honoris,
lambetq; ingenuas digna corona comas.
Ecce! paramus eam, quæ fulgida tempora cingat,
TEq; artemq; tuam fama loquetur anus.

MACASI

Annus agitur trigesimus quartus, cum pridie Nonarū Julii M. PAULUS MACASIUS in hac Academia pro summis privilegiis de ARTHRITIDE theses defenderet. Ille tot Illustrium personarum Medicus & Philosophus ἰσότης ὁ οὐρανὸν ἀγγίσσας lampadis fulgentissimæ instar TIBI præluceat. Quod hætenus strenuè egisti, persequere; & quam Hippocraticæ & Hermeticæ Medicinæ tibi exquisitam cognitionem comparasti, experientia confirma. Sic paternæ virtutis & felicitatis admiratores TE redivivo in Parente colent & magnificent. Hoc ut uberrima larga segete eveniat ex animo optar

Gvernerus Rolfinck Phil. Med. D.
Practicæ & Chimicæ P. Publicus,
Facultatis suæ Senior.

F I N I S.